

---

Subject: bitte um Rat

Posted by [sausewind](#) on Tue, 05 Jun 2012 05:42:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe schon öfter gepostet wegen Problemen mit nicht enden wollendem Shockloss in den verdichteten Bereichen (Schläfen). Verunsichert war ich vor allem deshalb, weil es so spät eingesetzt hat (6 Wochen nach OP) und jetzt, über 3,5 Monate danach, immer noch nicht ganz aufgehört hat. Aber zumindest ist es schon erheblich besser geworden. Ein Ende ist wohl endlich in Sicht.

Was mich nun aber zudem noch ziemlich belastet ist verstärkter Haarausfall im Donorgebiet! 3 Monate post-op (also vor 3 Wochen) hat das angefangen. Nicht übermäßig viel, aber doch deutlich wahrnehmbar (beim Kämmen, ect)

Was ist das? Das hat doch wohl absolut nichts mehr mit Shockloss zu tun, oder? Kommen eventuell noch andere Faktoren in Betracht, wie Spätreaktion auf Betäubungsspritzen, die erhöhte Spannung der Kopfhaut in dem Bereich?

Leute, ich bin echt ratlos, mache mir Sorgen. Ich bereue diese HT.

Ich hoffe, ihr habt einen Rat.

LG sausewind

---