
Subject: Shockloss nach FUT

Posted by [screydd](#) on Thu, 14 Mar 2013 08:30:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Tag,

vor 4 Wochen habe ich meine zweite FUT-Behandlung in Hamburg in Anspruch genommen. Die erste OP war 2009.

Ich stehe zwischen NW 2 und 3 und mir wurden 1.000 Grafts verpflanzt (1. OP 500 Grafts; sind nur schleppend angewachsen; daher eine zweite OP zur Verdichtung der Geheimratsecken). OP-Dauer; Streifenentnahme, Vorbereitung der Grafts, Umverteilung; ca. 4-5 Stunden...Weitere Infos auf Nachfrage...

Die Strip-Narbe ist relativ ordentlich verheilt. Allerdings ist Stand 4 Wochen Post-OP ein relativ auffälliger haarfreier Bereich unterhalb der Strip-Narbe geblieben. Zudem ein haarfreies Quadrat auf der linken Donorhälfte.

Solche Komplikationen hatte ich bei der ersten FUT nicht - und war damals noch Raucher und konnte mit Fug und Recht behaupten sich schlecht ernährt zu haben (Studentenleben^)...Dieses Mal habe ich mich an alle ärztlichen Vorgaben exakt gehalten und gehofft, dass sich dies positiv auf den Heilungsverlauf auswirken wird.

Wie würdet ihr den Bereich unterhalb der Narbe beurteilen? Ist jemand im Forum der meine Panik vor weiteren (hoffentlich nicht dauerhaften) Lücken teilt und ggf. auch schon gegen Shockloss nach einer FUT angekämpft hat? Habt ihr einen wertvollen Tip für mich? Mein Arzt meinte, dass ich es mit Kopfhautmassagen probieren muss, um die Durchblutung im Donorbereich verstärkt zu aktivieren und die Dame von der Haarberatung meinte, dass nix ungewöhnliches erblicken kann.

File Attachments

- 1) [6Tage_PostOP.JPG](#), downloaded 2466 times
 - 2) [13Tage_PostOP.JPG](#), downloaded 2175 times
 - 3) [29Tage_PostOP.JPG](#), downloaded 2127 times
-