

---

Subject: Miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich  
Posted by [Franky100](#) on Wed, 05 Feb 2020 20:14:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe gelesen, dass miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich für ein gutes HT-Ergebnis ein riesen Problem darstellen.

Wie kann man vor einer OP herausfinden, ob man solche miniaturisierten Haarfollikel im Spender hat?

Es gibt Ärzte, die ca. 200 Grafts entnommen haben und dann die OP abgebrochen haben. Wie kann man dies sicher vermeiden?

---

---

Subject: Aw: Miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich  
Posted by [Franky100](#) on Fri, 07 Feb 2020 14:07:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hat da keiner eine Meinung zu bzw. wird das nicht als Problem angesehen?

---

---

Subject: Aw: Miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich  
Posted by [Desmond](#) on Fri, 07 Feb 2020 22:05:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen miniaturisierten Donor und Abbruch der HT nach 200 grafts !

Wenn der Donor wirklich so stark miniaturisiert wäre, dann wäre diese Ausdünnung selbst für Laien gut sichtbar und erst recht für den behandelnden Arzt !

Ein Abbruch findet für gewöhnlich statt, wenn die grafts nur schwerlich intakt zu entnehmen sind. Meist aufgrund schlechter Laxity der Kopfhaut und/oder suboptimaler Anordnung der Haarwurzeln.

---

---

Subject: Aw: Miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich  
Posted by [HairWatcher](#) on Mon, 20 Dec 2021 13:03:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.

Kann man, und wenn ja woran kann man denn bei der Voruntersuchung einen miniaturisierten Spender erkennen?

Kann es auch sein, dass der Spenderbereich voll ist, aber dennoch eine Miniaturisierung da ist?

---

---

Subject: Aw: Miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich

Posted by [Blackster](#) on Mon, 20 Dec 2021 15:21:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Haare sind doch dann nur halb so dick.  
Das sehen die mit ihrem Mikroskop schon genau.

---

Subject: Aw: Miniaturisierte Haarfollikel im Spenderbereich

Posted by [BHRClinic](#) on Mon, 20 Dec 2021 16:21:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Franky,

sehr guter und wichtiger Punkt!!!

Eine hohe Miniaturisierung sieht man oft nur bei einer Donorvermessung, nicht mit freiem Auge.

Wir sprechen von hoher Miniaturisierung wenn diese über 20% liegt.

Dann raten wir auch von einer Haartransplantation ab!

Hier ein Video über weitere wichtige Dinge vom Donor:

<https://www.youtube.com/watch?v=E79rmZ5oX1o>

Viele Grüsse

Stefan

---