

---

Subject: Minoxidil gegen Shock Loss im Spenderbereich?

Posted by [Timo991](#) on Thu, 05 May 2022 15:17:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

Ich, 21 Tage Post HT, habe im Spenderbereich eine sehr kleine kahle Stelle bemerkt. Meine Klinik, die das auf Shock Loss zurückführt, hat mir nun geraten, für 6 Monate punktuell an genau dieser Stelle Minoxidil (2 mal täglich) anzuwenden und dann langsam abzusetzen. Laut Klinik, wird das "Loch" dadurch schneller und dichter zuwachsen.

Macht das aus eurer Sicht Sinn?

Ich würde dann vermutlich nur einen einzigen Pump-Stoß 2 mal täglich punktuell an diese Stelle anwenden.

Oder sind die Risiken (Nebenwirkungen und mögliches großflächiges Shedding???) zu groß und ich sollte besser passiv abwarten bzw. hoffen, dass das Loch auch ohne Minoxidil wieder zuwächst?

Ich freue mich über eure Rückmeldung. VIELEN DANK IM VORAUS! :)

Liebe Grüße

Timo

---

---

Subject: Aw: Minoxidil gegen Shock Loss im Spenderbereich?

Posted by [Haarsklave](#) on Fri, 06 May 2022 06:54:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke nicht, dass es schadet,versuch es doch

---