
Subject: Frage zu älterem Beitrag vom 23.01.07
Posted by [rene4432](#) on Thu, 12 Jul 2007 07:21:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe auf Seite 4 der hier einsehbaren Beiträge einen Beitrag vom User "Haki555" gelesen, dazu sind ein paar Fragen aufgekommen.

Er hat wohl 2 Strip-OP im Abstand von mehreren Jahren machen lassen. Haki555 hatte nicht nur den normalen Ausfall nach 3-4 Wochen im Empfängerbereich, sondern auch großflächig um die zweite Narbe herum, bishin zum Komplettausfall zwischen der ersten und zweiten Narbe. Meine Fragen sind dahater wie folgt:

Hängt dieser Ausfall im Spenderbereich damit zusammen, dass er 2 HT hat machen lassen? Ist soetwas einfach ein unglücklicher Einzelfall und sehr selten, oder ist es einigermaßen wahrscheinlich, oder besser gesagt gar nicht so unwahrscheinlich, dass nicht nur die "neuen" Haare ausfallen?

Danke für möglichst fundierte und handfeste Erfahrungsberichte und belegte Antworten!

Subject: Re: Frage zu älterem Beitrag vom 23.01.07
Posted by [rgv250blau](#) on Thu, 12 Jul 2007 09:11:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Schockfallout im Spenderbereich ist völlig normal,meist unterhalb der narbe verdünnen sich die haare.

Nach 4-5 Monaten ist aber alles wieder nachgewachsen zur ursprünglichen dichte!!

Keine Sorge völlig normal.
