
Subject: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?
Posted by [Minasterid](#) on Fri, 02 Oct 2009 22:05:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nehme jetzt seit etwas über einer Woche Finasterid (Propecia 1mg Tabletten). Schon bei der allerersten Tablette, die ich vor ca. 3 Wochen eingenommen hatte (danach 2 Wochen pausiert weil Freundin nun ins Ausland ist für 6 Monate und ich keine Erektionsstörungen riskieren wollte) hatte ich etwas Hodenziehen aber vor allem empfindliche Brustwarzen und Brustziehen. Als ich jetzt vor einer Woche angefangen hatte Propecia täglich zu nehmen habe ich von der Brustwarzenempfindlichkeit nichts mehr gespürt (und wenn nur sehr leicht), aber das Brustziehen ist geblieben (wenn auch mittlerweile leichter).

Ich wollte nun wissen, ob es vielleicht Erkenntnisse gibt, dass diejenigen, welche die Nebenwirkung Brustziehen verspüren unter erhöhter Gyno Gefahr schweben? Alle anderen NW kann ich nicht feststellen. Keine niedrigere Libido oder Erektionsfähigkeit, kein Brain Fog, nix mit den Augen, etc..

Da ich eh schon ein bißchen "Igelschnäützchen" Brust habe habe ich eigentlich nur vor einer Gyno wirklich Angst.
