

---

Subject: Ausfall an der Tonsur vs. Miniaturisierung an der Front

Posted by [ricc123](#) on Tue, 14 Apr 2015 10:32:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

Kann mir einer von euch erklären, wieso meine Haare fast ausschließlich an der Tonsur bzw. im hinteren Kopfbereich ausfallen und auch immer dünner werden, während vorne fast gar keine Haare ausfallen aber dennoch miniaturisieren und weniger werden?

Ich merke das vor allem wenn ich mir durch die Haare fahre oder beim Haare waschen. Während ich sobald ich in Richtung Tonsur komme immer Haare an der Hand habe, ist das nie der Fall wenn ich mir vorne durch die Haare fahre.

Ist das bei euch auch der Fall? Ich habe den Haarausfall generell erst an der Tonsur gemerkt und viel später erst realisiert, dass sich eigtl der gesamte Oberkopf ausgedünnt hat und dass die Geheimratsecken größer geworden sind.

Habe mich gefragt, ob das vielleicht mit ein Grund ist, warum Front und Tonsur so unterschiedlich auf Medikation reagieren, weil evtl. die Wirkmechanismen (z.B. große Überempfindlichkeit gegenüber DHT an der Tonsur vs. Überempfindlichkeit PGD2 an der Front) einfach anders sind.

Danke

---