

---

Subject: Aw: Hilfe

Posted by pilos on Fri, 20 Jul 2018 13:50:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 15:28pilos schrieb am Fri, 20 July 2018

14:23Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 15:18

Ich kenn mich nicht so gut aus, aber für mich liest sich das so dass nach 4 Tagen absetzen wieder DHT gebildet werden kann nach einer einzigen Dosis. Also paar Tage bis man es wieder nimmt nach ner Woche off ... 1000 Leute haben 3 On/1 Off angewendet ? Also bisher hab ich davon nur in diesem Forum gehört. In den Ami Foren wird es keinen Einzigen geben. Naja es ist jetzt so wie es ist.

es war aber keine einzeldosis nach 3 wochen :!:

über on/off wird schon seit 10 jahre debattiert

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/intermittent-propecia-use.67688/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15374729>

Okay aber in der Studie ist von alle 3 Tage die Rede... 3 Tage absetzen macht ja nichts mit deinem DHT Level.

3 oder 7 tage ist egal

du musst verstehen wie finasterid seine nebenwirkungen entfaltet

diese fixierung auf dht und tage ist völlig irrelevant

es ist ein schleichneder prozess, hat weder mit vermeintliche auf und ab zu tun uns auch nicht mit der AXIS zu tun....das kann in der kurzen zeit gar nichts ändern

dauer dht mangel kann abhängig vom eigenem AR polymorphysmus zum muskel/gewebe schwund im penis/prostata führen...entweder kommt es und/oder zur fibrose bzw. austausch von muskel durch fett in den schwellkörper....widerstand nimmt ab..gewebe wird leaky

dht mangel kann die endothelien, das sind muskelfaser in den blutgefäßen schwächen, das kann auch zur probleme führen

erektion entsteht im kopf nicht im penis

[https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/341072/#msg\\_341072](https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/341072/#msg_341072)

kannst ja mal mesterolone testen..das 1-methyl-dht..

---