

---

Subject: Dut topisch im Nacken testen

Posted by [matt82](#) on Wed, 19 Jun 2024 11:58:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In der Vergangenheit hatte ich schon Flavoxan14-Oberphase isoliert im Nacken getestet (keine spürbaren Auswirkungen)

Jetzt ist Dut topisch an der Reihe.

Ich möchte es zuerst am Hals testen um meine Augenregion nicht in Gefahr zu bringen, und so kann ich etwaigen systemischen Nebenwirkungen nachgehen. Und auf dem Oberkopf gebe ich dem RFM-Versuch weiter Raum.

Ich bin mittlerweile 48 Jahre alt - habe also keinen Hormonhaushalt mehr wie ein 25-jähriger, und kann auch schon seit einigen Jahre keinen überzeugenden Facon-Schnitt mehr tragen, weil im unteren Nacken vermehrt Flaum wächst.

Das Rezept in Pilos' Selbsthilfe rechnet mit einer 0,01% Konzentration.

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/24226/>

Bei Actifolic habe ich 0,25% eingekauft und möchte entsprechend verdünnen. Tagsüber auftragen, zur Nacht abwaschen.

Welche Konzentration macht in meinem Fall Sinn?

---