
Subject: Re: wie war das mit differenzen der lokalen 5a-r-expression?

Posted by pilos on Sat, 27 Oct 2007 18:45:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kkoo schrieb am Sam, 27 Oktober 2007 16:46es gab da doch nachgewiesene unterschiede (5-a-r typ, menge) zwischen versch. bereichen der kopfhaut? oder war das nur ein gerücht?

doch..doch...es gibt mindestes eine studie...

5ar1 frontal+occipital

5ar2 nur frontal

androgen receptor nur frontal

aga voraussetzung exprimierung von 5ars und androgen receptor....+ einen faktor... ..sehr wahrscheinlich tgf beta-1...durch diese induziert.

und ein sehr interessanter etwas modifizierter test....ist etwas komplizierter...ins detail....verkürzt ergibt:

in coculture:

keratocyte + dpc bart + androgenewuchs

keratocyte + dpc from aga + androgenealopecia

http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/72791/?srch=dpc#msg_7_2791

die chemie der rettung unserer haare....befindet sich im bart....sprich....die wissenschaft soll sich eher um die bartwuchs-entschlüsselung kümmern als um kahle flächen...