
Subject: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [Muhsin](#) on Sat, 19 Apr 2008 15:08:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Tag,

Die meisten hier sind, wie ich, Tablettenteiler. Deshalb möchte ich einen interessanten Fakt im Bezug auf die Teilung von Tabletten geben. Soll keine Panikmache sein, aber ist wohl wichtig für uns.

Dass die Teilung von Tabletten nicht immer unbedenklich für die Wirkstoffwirkung ist, ist vielen Pharmazeuten bekannt.

Professor Dr. Walter E. Haefeli, Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie:

Bei vielen Tabletten wird der Wirkstoff vor dem sauren Magensaft mit einem magensaftresistenten Überzug geschützt. Werden diese Tabletten geteilt, wird der Wirkstoff bereits im Magen freigesetzt, dabei zerstört und das Medikament wird unwirksam. Bei Tabletten mit einem so genannten Retard-Überzug, der die Freisetzung verlängert, kann die Wirkung des Medikamentes verkürzt werden oder, wenn der gesamte Wirkstoff auf einmal freigesetzt wird, das Risiko für Nebenwirkungen steigen.

Auch Tabletten mit speziellen Überzügen, die den Wirkstoff vor einer Inaktivierung durch Luftsauerstoff, Licht oder Feuchtigkeit schützen oder einen unangenehmen Geschmack überdecken, können nicht ohne weiteres geteilt werden.

Quelle: <http://www.klinikticker.de/index.php?id=732>

Nun stellt sich die Frage: Haben auch Tabletten mit Finasterid diesen Retard-Überzug und den magensaftresistenten Überzug?

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [kboo](#) on Sat, 19 Apr 2008 15:22:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haben keinen solchen überzug!

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [stef84](#) on Sat, 19 Apr 2008 15:23:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Diese Frage hatten wir ja auch schon eine Woche nicht mehr :

Proscar/Propecia hat einen nichtmagensaftresistenten Überzug! Der Wirkstoff wird zwar erst im Darm freigesetzt, aber die Beschaffenheit der Finasterid-Moleküle (Steroid-Ringstruktur) lässt sie die Magenpassage überstehen. Die Schutzschicht ist nur dazu da um z.B. schwangere Frauen vor Kontakt zu schützen.

Auch das feiliegende Fragment oxidiert nicht so schnell (erst nach mehreren Wochen merklich) und erfährt damit auch keinen Wirkungsverlust!

Also: Teilt alle Finasterid und schmeisst Merck nicht noch mehr Propecia-Millionen in den Rachen

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [Muhsin](#) on Sat, 19 Apr 2008 15:43:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry. Bin neu hier im Forum. Hab zwar viele alten Beiträge gelesen aber nicht alle. Du hast mal geantwortet, dass Finasterid ruhig an der Luft stehen darf - hab ich nicht vergessen - aber das mit dem Überzug hab ich noch nicht gelesen.

OK ist also auch das geklärt.

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [Michi1986b](#) on Sat, 19 Apr 2008 18:08:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist das bei allen FIN Tabs so? nicht nur bei Proscar? Ich habe Fin Basics! `??

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [Muhsin](#) on Sat, 19 Apr 2008 22:17:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Michi

Ich glaub schon, dass es auch bei Finasterid Basics kein Überzug gibt. Der Wirkstoff ist der gleiche in den Tabletten und der soll geschützt werden, aber Fin braucht, wie Stef84 schon sagte, keinen Schutz.

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [stef84](#) on Sun, 20 Apr 2008 08:57:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Genau

Ob Fin Basics oder Proscar ist völlig wurscht. Das einzige was die unterscheidet sind die Füllstoffe.

Wenn man sich dann doch die Finasterid-Fragmente in eine Kapsel stecken will, darauf achten nicht magensaftresistente Kapseln zu verwenden!

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [Bather](#) on Sun, 20 Apr 2008 20:17:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wieso soll man denn darauf achten, nicht-magensaftresistente kapseln zu verwenden? diese lösen sich doch im darm auf, wo finasterid resorbiert wird, demzufolge müsste das doch eigentlich egal sein, oder?

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [stef84](#) on Sun, 20 Apr 2008 20:48:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bather schrieb am Son, 20 April 2008 22:17wieso soll man denn darauf achten, nicht-magensaftresistente kapseln zu verwenden? diese lösen sich doch im darm auf, wo finasterid resorbiert wird, demzufolge müsste das doch eigentlich egal sein, oder?

Nein, sie lösen sich im Magen auf! Das ist ja der Witz! Nichtmagensaftresistent!

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [Bather](#) on Sun, 20 Apr 2008 20:57:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sorry, hab mich falsch ausgedrückt

ich meinte, wieso sollte man denn nicht magensaftresistente kapseln benutzen? also warum ist es falsch, magensaftresistente kapseln zu benutzen? diese würden doch das fin direkt in den darm transportieren und erst dort freisetzen, wo es ja auch absorbiert wird. klar übersteht es die magensäure auch ohne diesen schutz, aber schaden dürfte es doch eigentlich nicht, oder? ich frage das nur, da ich paradoxerweise auch die erfahrung gemacht habe, dass ich wieder kopfjucken bekam, als ich magensaftresistente kapseln verwendete. bei normalen kapseln geht das jucken drastisch zurück, was mir impliziert, dass bei verwendung von resistenten kapseln die wirkung weniger gut ist

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [stef84](#) on Sun, 20 Apr 2008 22:06:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde das so erklären, dass sich die magensaftresistenten Kapseln ja erst auflösen müssen. Das heißt das Fin kann sich erst im unteren Bereich wirken und die Bioverfügbarkeit ist sicher geringer. Im anderen Fall wirkt es im ganzen Darmbereich. Meine Vermutung.

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [ShiSha_Sh lumpf](#) on Mon, 21 Apr 2008 07:40:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Son, 20 April 2008 10:57Genau

Ob Fin Basics oder Proscar ist völlig wurscht. Das einzige was die unterscheidet sind die Füllstoffe.

Wenn man sich dann doch die Finasterid-Fragmente in eine Kapsel stecken will, darauf achten nicht magensaftresistente Kapseln zu verwenden!

-Gelatine-Kapseln sind also Okay???

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [pilos](#) on Mon, 21 Apr 2008 07:42:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Son, 20 April 2008 10:57Genau

Ob Fin Basics oder Proscar ist völlig wurscht. Das einzige was die unterscheidet sind die Füllstoffe.

nicht mal die Füllstoffe sind unterschiedlich...

Subject: Re: Wirkstoffnachlass furch Teilung auch bei Finasterid?

Posted by [stef84](#) on Mon, 21 Apr 2008 14:16:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 21 April 2008 09:42stef84 schrieb am Son, 20 April 2008 10:57Genau

Ob Fin Basics oder Proscar ist völlig wurscht. Das einzige was die unterscheidet sind die Füllstoffe.

nicht mal die Füllstoffe sind unterschiedlich...

Auch gut
