

---

Subject: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Fri, 09 May 2008 13:20:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Forum! Ich nehme mir doch jetzt mal einfach die Freiheit und formuliere mal ein paar Gerüchte zu geteilten Proscar bzw. Finasterid-Gernikas aus, da diese Fragen doch im regelmäßigen 2-Wochen-Rythmus kommen.

Wäre vielleicht nicht schlecht, dass im Finasterid-Forum anzuheften.

Gerücht 1: Finasterid wirkt nicht weil der Wirkstoff erst im Darm aufgenommen werden soll, durch die zerstörte Schutzschicht aber bereits im Magen zersetzt wird. Falsch!

Es ist zwar vollkommen richtig, dass der Wirkstoff erst im Darm aufgenommen wird, jedoch wird dies durch eine zerstörte Schutzschicht nicht verhindert! Das Finasterid-Molekül kann man chemisch als Steroid-Ringstruktur beschreiben, welche gegen die Magensäure immun ist, also die Magenpassage übersteht!

Wenn dem nicht so wäre müsste außerdem auf der Verpackung "magensaftresistente" Filmtabletten stehen, was es aber nicht tut.

Einen weiteren Beweis kann man sich selbst liefern indem man ein Proscar-Fragment und eine Propecia-Tablette in ein Glas Wasser wirft. Die Schutzschicht wird sich sofort auflösen. Dies geschieht also auch bei der Einnahme mit einem Glas Wasser, aber spätestens im Magen. Also der Wirkstoff kommt schon "schutzschichtfrei" im Magen an.

Nun, warum die Schutzschicht? Schon kleine Mengen Finasterid können die Entwicklung des Embryos einer schwangeren Frau gefährden, und somit wird die Berührung von Frauen mit dem Wirkstoff verhindert! Also wenn ihr teilt, haltet die Fragmente von Frauen fern!

Gerücht 2: Man kann Proscar nicht exakt durch 4 bzw. 5 teilen und nicht gleich große Fragmente wirken nicht oder schlechter. Falsch!

Finasterid hat eine Halbwertszeit von 8 Stunden. Das hört sich jetzt nicht viel an, wenn man bedenkt dass am nächsten Tag nur noch 12,5% des Wirkstoffs im Blut vorhanden ist, doch die Kummulierung über mehrere Tage lässt einen relativ hohen und konstanten Pegel im Blut entstehen, was eine weniger exakte Teilung für einen konstanten Pegel erlaubt. Das kann man sich mit einer einfachen beschränkten Wachstums-Funktion selbst ausrechnen. Selbst das auslassen oder vergessen einer Einnahme bringt diesen Pegel nicht erwähnenswert ins Wanken.

Desweiteren scheint es unabhängig davon gar nicht zu schaden, beispielsweise alle 3 Wochen eine Woche mit der Einnahme auszusetzen und so den Körper von diesem konstanten Pegel zu entwöhnen und eben Gewöhnungseffekten entgegenzuwirken. Aber diese sogenannte Upregulation-Diskussion soll hier nicht Thema sein.

Gerücht 3: Die Knubbeltheorie Also, dass der Wirkstoff also "Knubbel" bzw. Klumpen in einer Ecke der Tablette steckt und somit man nur alle 4 bzw. 5 Tage Wirkstoff abbekommt und dann dafür überdosiert. Natürlich auch falsch!

Man kann sich den Fertigungsprozess nicht so vorstellen, dass man die Tablette auf macht, den Wirkstoff rein wirft und dann mit Füllstoff auffüllt. Das wäre schon von daher schwierig, dass man ein Mikroskop bräuchte um 5mg überhaupt auszumachen geschweige denn zu dosieren. Der Prozess läuft eher so ab, natürlich grob vereinfacht und verbildlicht, dass man eine verhältnismäßige Menge Wirkstoff und Füllstoff zusammen mischt. Der Wirkstoff verteilt sich dann gleichmäßig im Füllstoff, dass das so ist kann man durch statistische Rechnung

beweisen, und heraus kommt gleichmäßig verteilter Wirkstoff in der Tablette, mit einer geringen Toleranz natürlich.

Gerücht 4: Ein paar Worte zu Generikas.

Alle in deutschen Apotheken erhältlichen Finasterid-Generikas sind wirksam. Sie unterscheiden sich von Proscar, wenn überhaupt, nur im Füllstoff.

Ähnliches kann man von Produkten der Marke Cipla sagen. Cipla ist eine indische Firma, die mit hoher Qualität produziert und sogar im indischen Aktienindex registriert ist. Die Herstellung von Proscar und vor allem Propecia-Generikas ist für Cipla nach indischem Recht vollkommen legal. Das unabhängig davon, generell Markenfälschungen ohne oder mit weniger Wirkstoff vorliegen will ich natürlich nicht ausschließen, aber der Marke Cipla ist grundsätzlich zu trauen.

Kein Gewähr auf Perfektion Kritik und Ergänzungen erwünscht

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Michi85](#) on Fri, 09 May 2008 13:34:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gute Arbeit

Man könnte viel. die Kernaussagen, also die Stätze nach "Gerücht 1-4" noch farblich oder mit einer anderen Schriftart besser hervorheben.

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [bananas](#) on Fri, 09 May 2008 15:05:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Finde ich schonmal für einen Neuling informativ.

Ich stelle mir das angepinnt vor - als Ergänzung jedoch auch eine Art Liste "wahrscheinliche Nebenwirkung in Prozent aufgrund der Forenteilnehmer , Wirkungseintritt von Forenteilnehmern, Verbesserungsschätzung der Forenteilnehmern und solche Sachen. Ich finde, das spiegelt schon die Realität wieder.

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [jimmi](#) on Sat, 10 May 2008 09:21:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Als stützendes Beispiel fällt mir dazu noch ein, dass es in allen medizinischen Bereichen (Psychiartrie etc.) die tägliche Praxis ist, Medikamente in Hälften und Viertel zu teilen. Ärzte

verschreiben beispielsweise: 1/4 "xxx" täglich.

Warum sollte es auch sonst Tablettenteiler geben. Wenn man sich das mal kurz überlegt ist es einfach logisch, dass man Proscar u.a. bedenkenlos teilen kann.

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Fritz Fantom](#) on Sat, 10 May 2008 11:35:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

bananas schrieb am Fre, 09 Mai 2008 17:05"wahrscheinliche Nebenwirkung in Prozent aufgrund der Forenteilnehmer"

Die Prozent der Forenteilnehmer repräsentieren nicht die wahrscheinlichen Nebenwirkungen. Aufgrunddessen, da das Forum überdurchschnittlich viele Leute mit Nebenwirkungen überhaupt erst aufsuchen.

Was heißt eigentlich "wahrscheinliche"? "Mögliche" Nebenwirkungen würd ichs formulieren. Wahrscheinliche hört sich so an, als wenn man sie dann bekommt und nur mit ganz viel Glück nicht.

Wenn du einem Finanfänger "wahrscheinliche" Nebenwirkungen aufzählt, dann wird er einige davon automatisch verspüren, obwohl sie nicht da sind.

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [benutzer81](#) on Sat, 10 May 2008 14:02:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fritz Fantom schrieb am Sam, 10 Mai 2008 13:35bananas schrieb am Fre, 09 Mai 2008 17:05"wahrscheinliche Nebenwirkung in Prozent aufgrund der Forenteilnehmer"

Die Prozent der Forenteilnehmer repräsentieren nicht die wahrscheinlichen Nebenwirkungen. Aufgrunddessen, da das Forum überdurchschnittlich viele Leute mit Nebenwirkungen überhaupt erst aufsuchen.

Also wie ich das seit meiner registrierung mitbekommen habe, sind es kaum user die wegen auftretender nw`s das forum aufsuchen sondern vielmehr user, die nach einigen monaten der fineinnahme unzufrieden bzüglich der wirkung sind, deshalb erst mit recherchen im netz beginnen und dadurch auf dieses forum stoßen.

Oder user, die erst rechechieren, sich im forum registrieren und danach erst mit fin beginnen.

Wo ich dir aber recht gebe ist, das nebenwirkungen bei beiden personengruppen erst durch bessere recherche bzw. einlesen in das forum auftreten. Das bedeutet das

a) es häufig nw`s sind die der laie zuvor gar nicht wahrgenommen hat

oder

b) einige nw`s in den köpfen der forumuser entsteht und die sich gegenseitig derart "hochpushen" bis es zur einer regelerscheinung wird.

Denke das es eine mischung aus beidem ist. Aber für repräsentativ halte ich das forum schon (gerade auch bezüglich der wirkung auf den ha)

Btw @stef, saubere arbeit

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [bananas](#) on Sat, 10 May 2008 14:23:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Was heißt eigentlich "wahrscheinliche"? "Mögliche" Nebenwirkungen würd ichs formulieren. Wahrscheinliche hört sich so an, als wenn man sie dann bekommt und nur mit ganz viel Glück nicht.

Wenn du einem Finanfänger "wahrscheinliche" Nebenwirkungen aufzählt, dann wird er einige davon automatisch verspüren, obwohl sie nicht da sind.

Die Umformulierung in "möglich" sehe ich als kein Problem.

Mit Prozentual meine ich, dass die Packungsbeilage eine andere Sprache spricht als es tatsächlich ist.

Ich bezweifle auch, das die ohne NW ständig im Forum sind, jedoch kann ich mir vorstellen, das hier quasi an erster Stelle probiert und gematscht wird und DAS wird bestimmt viele interessieren, die Fin oder Co. nehmen. Hinzu kommt noch, das mind. 50% der Besucher sich gar nicht anmelden sondern nur lesen wollen, bis ihre Fragen beantwortet sind.

Ich habe mir auch nicht vorgenommen, die Welt über Fin aufzuklären, aber die Zusammenstellung an Fragen und Antworten auf der "sponsored by msd Seite" sind viel zu naiv und positiv.

Nebenwirkung können auch neutral geschrieben werden, ohne mit dem Finger abzumahnen.

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Fritz Fantom](#) on Sun, 11 May 2008 16:03:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

benutzer81 schrieb am Sam, 10 Mai 2008 16:02

Also wie ich das seit meiner registrierung mitbekommen habe, sind es kaum user die wegen auftretender nw`s das forum aufsuchen

Also hier sind gleich spontan ein paar typische Erster-Post-und-gleich-NW User:

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/119552/#msg\\_119552](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/119552/#msg_119552)

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/113684/#msg\\_113684](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/113684/#msg_113684)

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/88432/#msg\\_88432](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/88432/#msg_88432)

<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/10530/>

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/14232/#msg\\_14232](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/14232/#msg_14232)

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [benutzer81](#) on Mon, 12 May 2008 09:28:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das mag sein.. wirst aber auch sehr viele posts finden, in denen die user nach ihrer registrierung gleich darüber klagen, keine wirkung festzustellen. Oder wann es denn endlich einsetzt, das haarwunder..

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Glocke](#) on Wed, 02 Jul 2008 13:57:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Fre, 09 Mai 2008 15:20... geteilten Proscar bzw. Finasterid-Gernikas aus ...

... Ein paar Worte zu Generikas. ...

Alle in deutschen Apotheken erhältlichen Finasterid-Generikas ...

... allem Propecia-Generikas ist für Cipla ...Hallo,

Gerücht X: Mehrzahl von Generikum ist Generikas

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Hammerhaar](#) on Wed, 02 Jul 2008 13:59:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Haarakiri schrieb am Mit, 02 Juli 2008 15:57stef84 schrieb am Fre, 09 Mai 2008 15:20... geteilten Proscar bzw. Finasterid-Gernikas aus ...

... Ein paar Worte zu Generikas. ...

Alle in deutschen Apotheken erhältlichen Finasterid-Generikas ...

... allem Propecia-Generikas ist für Cipla ...Hallo,

Gerücht X: Mehrzahl von Generikum ist Generikas

---

Zitat:Kein Gewähr auf Perfektion Kritik und Ergänzungen erwünscht

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [eragon](#) on Wed, 02 Jul 2008 14:30:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gerücht Y: Haarakiri hat ein Fremdwörterbuch unterm Kopfkissen

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Glocke](#) on Wed, 02 Jul 2008 14:37:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zum Glück stimmen alle Gerüchte in diesem Thread nicht

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [eragon](#) on Wed, 02 Jul 2008 14:50:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [jimmi](#) on Wed, 02 Jul 2008 16:30:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich nehme seit etwas mehr als 2 Monaten Fin von Hexal (jeden tag 1/4, also sollten es ca. 1,25 mg pro tag sein)und habe davor ca. 1,5 Jahre original propecia (1 mg tablette) genommen. Der Haarausfall ist bei mir nun seit wenigen wochen deutlich schlimmer als zuvor und irgendwie werde ich das gefühl nicht los, dass es was mit dem wechsel zu tun hat. Ich will hier jetzt nicht sagen: Prpecia wirkt bei mir super, und geteiltes fin überhaupt nicht... bloß liegt es nahe, dass die Verschlimmerung des HA etwas mit dem Tablettenwechsel zu tun, mache sonst nix anders als zuvor. kann natürlich sein dass es einfach so kommt, doch der verdacht, es liegt am Fin von Hexal, ist doch irgendwie berechtigt, oder?

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Wed, 02 Jul 2008 21:20:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, ich studiere halt doch nicht deutsch, haarakiri! Aber weißt du wie schwer die Pluralbildung in

---

der schwedischen Sprache ist (weil da wohne ich)! Da kann man bei so was einfachem schon mal durcheinander kommen.

Auf den Schreck muss ich aber jetzt erst mal zwei Pizzens essen. Und dieser Plural stimmt. Das steht nämlich so in meinen Lexikas!

@hammerhaar: Danke für deine Unterstützung. Solche Mods wünscht man sich doch.

@jimmi: Der Verdacht liegt natürlich nahe. Ich habe schon ähnliche Probleme gehört. Da war es der Wechsel von Propecia auf Proscar. Und in einem anderen Fall war es der Wechsel von Hexal-Fin auf Proscar! Eigentlich unlogisch wenn man es im Zusammenhang betrachtet, oder?

Dieser verstärkte Haarausfall kann auch andere Gründe haben. Fellwechsel. Verstärkter Ausfall durch Sonneneinstrahlung... Wenn du durchhältst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du in einem halben Jahr trotzdem keine verschlechterte deines Zustandes sehen kannst. Garantieren kann ich es natürlich nicht. Aber man muss Haarausfall immer längerfristig betrachten. Haarausfallschübe sind weit verbreitet. Aber nicht immer verschlechtert sich dabei der Haarausfall.

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Mon, 27 Oct 2008 21:16:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hmm, komischerweise ist mir der "Sticky-Thread" erst jetzt aufgefallen.

Da fällt mir gleich zu ein, mit der Wirksamkeit, und zwar die Tatsache, oder was eben von vielen immer behauptet wird, das es auch in sehr sehr geringen Dosen immer 70 % blockt!

Das könnte man evt. noch mit aufnehmen, oder ist man sich da immer noch nicht so sicher?

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [pilos](#) on Mon, 27 Oct 2008 21:41:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Mon, 27 Oktober 2008 22:16

Da fällt mir gleich zu ein, mit der Wirksamkeit, und zwar die Tatsache, oder was eben von vielen immer behauptet wird, das es auch in sehr sehr geringen Dosen immer 70 % blockt!

Das könnte man evt. noch mit aufnehmen, oder ist man sich da immer noch nicht so sicher?

doch..doch das ist absolut sicher...

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Tue, 28 Oct 2008 11:53:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aber vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es trotzdem Beispiele gibt bei denen die Minidosis Finasterid nicht oder schlechter wirkte als die "normale" Dosis. Warum auch immer...

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Tue, 28 Oct 2008 12:39:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ok also ich stütze mich dabei auf ne Aussage von Humboldt

da [http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/133487/?srch=verschrumpelte#msg\\_133487](http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/133487/?srch=verschrumpelte#msg_133487)

Humboldt schrieb am Sam, 23 August 2008 17:34

Aber wie gesagt, es gibt viele jahrelange Fin-user, die mit einer Mini-Dosis ihren Status weiter genauso halten! Und zwar mit Dosen, bei denen so gut wie kein Serum-DHT mehr gehemmt wird, sondern nur noch Scalp-DHT. Wie kann man sich das sonst erklären?

Das wär doch quasi die optimale Lösung, auch für alle die die NW's haben, vollen Serum DHT, und 70% ige Kopfhaut-DHT Reduzierung!

Und das interessiert mich eben so brennend! Das wär doch genial!

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Sun, 02 Nov 2008 21:40:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In der englischen wikipedia stehts sogar offiziell mit drin!

Zitat:

The UC Berkeley Wellness Letter expressed concern in March 2003 about the unproven long-term safety of Propecia and recommended cutting a standard 1 milligram dose of Propecia into quarters to reduce the cost without reducing its effectiveness. This claim appears to be supported by clinical pharmacological data reviewed by the FDA during Propecia's approval process that suggested that the advantage of taking 1 mg per day over 0.2 mg per day is statistically small.[]

das pdf dazu!

[http://www.fda.gov/cder/foi/nda/97/20788\\_PROPECIA%20TABLETS,%201MG\\_BIOPHARMR.PDF](http://www.fda.gov/cder/foi/nda/97/20788_PROPECIA%20TABLETS,%201MG_BIOPHARMR.PDF)



Also für mich bedeutet das, wenn NW's weniger unter 0,2 mg, dann demzufolge auch weniger geblockt!  
Is doch ganz logisch oder?

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!  
Posted by [cartman80](#) on Sun, 15 Feb 2009 10:04:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

darf ich fragen warum du Fin abgesetzt hast?

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!  
Posted by [stef84](#) on Mon, 16 Feb 2009 10:31:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

cartman80 schrieb am Son, 15 Februar 2009 11:04darf ich fragen warum du Fin abgesetzt hast?

Wenn du mich meinst...

Nebenwirkungen. Und nicht zu knapp (Errektion und Libido). Irgendwann hats mir einfach gereicht!

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!  
Posted by [cartman80](#) on Mon, 16 Feb 2009 11:42:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

jo, dich meinte ich. Nebenwirkungen in welcher Form außer bei Erektion und Libido sind denn bei der aufgetreten?

Gruß

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!  
Posted by [stef84](#) on Mon, 16 Feb 2009 19:18:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

cartman80 schrieb am Mon, 16 Februar 2009 12:42jo, dich meinte ich. Nebenwirkungen in welcher Form außer bei Erektion und Libido sind denn bei der aufgetreten?

Gruß

Ausser dem genannten hatte ich absolut keine Probleme. Und auch eine gute Wirkung. Aber Potenzstörungen und eine verschwundene Libido reichen ja auch schon wie ich finde...

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Mon, 16 Feb 2009 19:23:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Apropos Potenzstörungen, neulich mal son PDE-5 Hemmer probiert, und Erektion war bei mir Hammer, trotz 1 mg Fin.

Sonst auch immer schwächer.

Woran liegt das dann? Erhöht Fin nun evt. PDE-5???

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Thu, 19 Feb 2009 15:16:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Mon, 16 Februar 2009 20:23 Apropos Potenzstörungen, neulich mal son PDE-5 Hemmer probiert, und Erektion war bei mir Hammer, trotz 1 mg Fin.

Sonst auch immer schwächer.

Woran liegt das dann? Erhöht Fin nun evt. PDE-5???

Nein. Fin erhöht das nicht das PDE 5.

Errektionsstörungen haben verschieden Gründe. Rauchen, Arterienverkalkung, Alter etc. oder eben Medikamente. Keine davon beeinflusst irgendwie das PDE 5. Aber helfen tun die PDE5 Hemmer trotzdem (wenn man Glück hat; tun sie aber bei den meisten). Die PDE5-Hemmung macht das Erreichen der Erektion nur eben grundsätzlich einfacher, unabhängig von deren Ursache (körperliche Schäden, wie Lähmung, venöses Leck o.ä. mal ausgenommen).

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Thu, 19 Feb 2009 15:41:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Don, 19 Februar 2009 16:16

...

Errektionsstörunge haben verschieden Gründe. Rauche, Arterienverkalkung, Alter oder eben Medikamente.

...

Jo und eben ein erniedrigter Testosteronspiegel!

Komisch das man eben überall immer Testosteronspigel liest, also das ab einem gewissen Wert dann eben Impotenz eintritt, oder eintreten kann.

Meinen die dann da eigentlich DHT, weil dsvon ausgegangen wird das das nicht irgendwie gehemmt wird??

Was würde z.B. ein Arzt sagen??

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Thu, 19 Feb 2009 17:41:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Don, 19 Februar 2009 16:41stef84 schrieb am Don, 19 Februar 2009 16:16

...

Errektionsstörunge haben verschieden Gründe. Rauche, Arterienverkalkung, Alter oder eben Medikamente.

...

Jo und eben ein erniedrigter Testosteronspiegel!

Komisch das man eben überall immer Testosteronspigel liest, also das ab einem gewissen Wert dann eben Impotenz eintritt, oder eintreten kann.

Meinen die dann da eigentlich DHT, weil dsvon ausgegangen wird das das nicht irgendwie gehemmt wird??

Was würde z.B. ein Arzt sagen??

Ein niedriger Testosteronspiegel ist extrem selten die Ursache! Jeder hat da seinen eigenen "Normbereich". Es gibt keinen Grenzwert, ab dem dann die Probleme eintreten. Das ist Blödsinn! Das T ist auch eher für die Libido zuständig. DHT hat wohl auch einen Einfluss auf die Libido.

Wenn du denkst, dass zu wenig T ein Grund sein könnte, könnte man ja mal testweise 3 Monate Testosteron substituieren um zu schauen ob bei einem persönlich wirklich T der Grund der Probleme ist.

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Thu, 19 Feb 2009 18:43:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Don, 19 Februar 2009 18:41

Ein niedriger Testosteronspiegel ist extrem selten die Ursache! Jeder hat da seinen eigenen "Normbereich". Es gibt keinen Grenzwert, ab dem dann die Probleme eintreten. Das ist Blödsinn! Das T ist auch eher für die Libido zuständig. DHT hat wohl auch einen Einfluss auf die Libido.

...

Ok das beruhigt mich ja

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Gast](#) on Wed, 29 Jul 2009 16:31:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Ich habe mal eine Excel Tabelle erstellt, in der man den Finasterid-Spiegel im Körper einsehen kann. Am Ende des ersten Tages sind bei einer Halbwertszeit von 8 Stunden noch 12.5% der Einnahmemenge vorhanden, sodass bei der Einnahme am nächsten Tag statt zB 1 mg vom vortag bereits 1.25 mg vorhanden sind, am folgenden Tag noch mehr, sodass man einiger Zeit eine hohe Dosis permanent im Körper hat. Hört sich in der Theorie ganz gut an.

In meiner Tabelle aber steigt dieser Wert nicht wirklich hoch an.

Bei 1mg pro Tag und 8 Stunden Halbwertszeit zB hat man (nach dem Einpegeln nach einigen Tagen) 23 Stunden nach der letzten Einnahme, also kurz vor der nächsten Einnahme, nur noch 0.1578 mg im Körper und diese werden auch nach 1 Jahr nicht mehr.

Nimmt man alle 4 Tage eine geviertelte 5mg Tablette, also 1.25 mg am Tag und am fünften Tag 0, dann hat man am Ende des fünften Tages nur 0.0269 mg, was mir sehr wenig erscheint. Von hohen Dosen nach langer Einnahmezeit kann nicht im geringsten die Rede sein. Regelmäßige Pausen, wie empfohlen, würden den Spiegel sogar auf nahe 0 senken. Liegt die Halbwertszeit nicht bei 8, sondern nur bei 5-7 Stunden, wie oft zu lesen ist, sinkt der Spiegel sogar noch stärker ab.

Vielleicht könnte sich jemand von der Richtigkeit der Tabelle überzeugen. Ich wäre sogar froh wenn sie falsch wäre, weil Ich dann die Tabletten vierteln könnte, was ungleich einfacher ist als sie zu fünfteln.

Die grünen Zahlen zeigen die jeweilige Dosis im Körper zum jeweiligen Tag (oberste Zeile) und zur jeweiligen Zeit (linke Spalte, Annahme man nimmt die Tablette um 0 Uhr ein).

In der untersten roten Zeile kann man die Einnahmedosis am jeweiligen Tag eingeben und die Halbwertszeit ist auch variabel einstellbar. Ich weiß, ist nich wirklich schön und übersichtlich bei Fragen bitte melden.

### File Attachments

1) [Halbwertszeit Finasterid.xls](#), downloaded 843 times

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Fri, 07 Aug 2009 10:11:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

woodyspruce schrieb am Mit, 29 Juli 2009 18:31Hallo,

Ich habe mal eine Excel Tabelle erstellt, in der man den Finasterid-Spiegel im Körper einsehen kann. Am Ende des ersten Tages sind bei einer Halbwertszeit von 8 Stunden noch 12.5% der Einnahmemenge vorhanden, sodass bei der Einnahme am nächsten Tag statt zB 1 mg vom vortag bereits 1.25 mg vorhanden sind, am folgenden Tag noch mehr, sodass man einiger Zeit eine hohe Dosis permanent im Körper hat. Hört sich in der Theorie ganz gut an.

In meiner Tabelle aber steigt dieser Wert nicht wirklich hoch an.  
Bei 1mg pro Tag und 8 Stunden Halbwertszeit zB hat man (nach dem Einpegeln nach einigen Tagen) 23 Stunden nach der letzten Einnahme, also kurz vor der nächsten Einnahme, nur noch 0.1578 mg im Körper und diese werden auch nach 1 Jahr nicht mehr.

Nimmt man alle 4 Tage eine geviertelte 5mg Tablette, also 1.25 mg am Tag und am fünften Tag 0, dann hat man am Ende des fünften Tages nur 0.0269 mg, was mir sehr wenig erscheint. Von hohen Dosen nach langer Einnahmezeit kann nicht im geringsten die Rede sein. Regelmäßige Pausen, wie empfohlen, würden den Spiegel sogar auf nahe 0 senken. Liegt die Halbwertszeit nicht bei 8, sondern nur bei 5-7 Stunden, wie oft zu lesen ist, sinkt der Spiegel sogar noch stärker ab.

Vielleicht könnte sich jemand von der Richtigkeit der Tabelle überzeugen. Ich wäre sogar froh wenn sie falsch wäre, weil Ich dann die Tabletten vierteln könnte, was ungleich einfacher ist als sie zu fünfteln.

Die grünen Zahlen zeigen die jeweilige Dosis im Körper zum jeweiligen Tag (oberste Zeile) und zur jeweiligen Zeit (linke Spalte, Annahme man nimmt die Tablette um 0 Uhr ein). In der untersten roten Zeile kann man die Einnahmedosis am jeweiligen Tag eingeben und die Halbwertszeit ist auch variabel einstellbar. Ich weiß, ist nich wirklich schön und übersichtlich bei Fragen bitte melden.

Da hast du recht!

Das ist schlecht oder sogar falsch ausgedrückt!

Aber die Kernaussage stimmt trotzdem, nur mit einer anderen Begründung:

Klar, bei längerer Pause sinkt der Fin-Spiegel auf null.

Aber das AR2-Enzym ist weiterhin geblockt. Und eine gehemmt es Enzym ist bis auf alle Ewigkeit unwirksam. Also muss neues gebildet werden. Bis neues gebildet wird dauert aber eine Weile.

Das heißt, dass weiterhin die gleiche Menge DHT gehemmt ist, was ja das Entscheidende ist!

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Sun, 09 Aug 2009 19:38:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stef84 schrieb am Fre, 07 August 2009 12:11

Bis neues gebildet wird dauert aber eine Weile.

...

und wie lange ist das nun?

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Sun, 09 Aug 2009 20:57:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Son, 09 August 2009 21:38stef84 schrieb am Fre, 07 August 2009 12:11

Bis neues gebildet wird dauert aber eine Weile.

...

und wie lange ist das nun?

Keine Ahnung

Damit kenne ich mich nicht aus. Liegt aber sicher im Bereich von einigen Tagen, wenn nicht sogar Wochen, bis wieder genügend 5 $\alpha$ RII vorhanden ist um Testosteron in DHT umzuwandeln, so dass wieder der normale Pegel herrschen.

Für genaueres müsstest du dich aber an die Hormonspezialisten hier im Forum wenden.

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [mesh](#) on Wed, 09 Sep 2009 17:40:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dazu habe ich eine Frage, ich teile immer Sonntag 2 Tabletten in 8 Teile und nehme sie dann in dieser Woche. Was heißt das nun? nach 8 Stunden ist die Wirkung fast weg und die anderen 7 Teile haben nur noch ganz wenig Wirkung?

Zitat:Gerücht 2: Man kann Proscar nicht exakt durch 4 bzw. 5 teilen und nicht gleich große Fragmente wirken nicht oder schlechter. Falsch!

Finasterid hat eine Halbwertszeit von 8 Stunden. Das hört sich jetzt nicht viel an, wenn man bedenkt dass am nächsten Tag nur noch 12,5% des Wirkstoffs im Blut vorhanden ist, doch die Kummulierung über mehrere Tage lässt einen relativ hohen und konstanten Pegel im Blut entstehen, was eine weniger exakte Teilung für einen konstanten Pegel erlaubt. Das kann man sich mit einer einfachen beschränkten Wachstums-Funktions selbst ausrechnen. Selbst das auslassen oder vergessen einer Einnahme bringt diesen Pegel nicht erwähnenswert ins Wanken.

Desweiteren scheint es unabhängig davon gar nicht zu schaden, beispielsweise alle 3 Wochen eine Woche mit der Einnahme auszusetzen und so den Körper von diesem konstanten Pegel zu entwöhnen und eben Gewöhnungseffekten entgegenzuwirken. Aber diese sogenannte Upregulation-Diskussion soll hier nicht Thema sein.

---

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Wed, 09 Sep 2009 22:57:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mesh schrieb am Mit, 09 September 2009 19:40Dazu habe ich eine Frage, ich teile immer

Sonntag 2 Tabletten in 8 Teile und nehme sie dann in dieser Woche. Was heißt das nun? nach 8 Stunden ist die Wirkung fast weg und die anderen 7 Teile haben nur noch ganz wenig Wirkung?

Zitat:Gerücht 2: Man kann Proscar nicht exakt durch 4 bzw. 5 teilen und nicht gleich große Fragmente wirken nicht oder schlechter. Falsch!

Finasterid hat eine Halbwertszeit von 8 Stunden. Das hört sich jetzt nicht viel an, wenn man bedenkt dass am nächsten Tag nur noch 12,5% des Wirkstoffs im Blut vorhanden ist, doch die Kummulierung über mehrere Tage lässt einen relativ hohen und konstanten Pegel im Blut entstehen, was eine weniger exakte Teilung für einen konstanten Pegel erlaubt. Das kann man sich mit einer einfachen beschränkten Wachstums-Funktions selbst ausrechnen. Selbst das auslassen oder vergessen einer Einnahme bringt diesen Pegel nicht erwähnenswert ins Wanken.

Desweiteren scheint es unabhängig davon gar nicht zu schaden, beispielsweise alle 3 Wochen eine Woche mit der Einnahme auszusetzen und so den Körper von diesem konstanten Pegel zu entwöhnen und eben Gewöhnungseffekten entgegenzuwirken. Aber diese sogenannte Upregulation-Diskussion soll hier nicht Thema sein.

Natürlich nicht! Die Halbwertszeit gilt bei Vorhandensein von Finasterid im Blut!  
An der Luft wird nichts abgebaut!

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Fin](#) on Sun, 18 Oct 2009 11:25:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@stef84

kannst du uns die quellen deiner aussagen in deinem ersten beitrag in diesem thread nennen?

ich rätsel immer noch rum ob geteiltes fin nicht wirkt...

mfg

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Sun, 18 Oct 2009 12:50:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ari104 schrieb am Sun, 18 October 2009 13:25@stef84

kannst du uns die quellen deiner aussagen in deinem ersten beitrag in diesem thread nennen?

ich rätsel immer noch rum ob geteiltes fin nicht wirkt...

mfg

Der Beitrag ist keine wissenschaftliche Arbeit, daher habe ich die Quellen nicht zitiert. Keine Ahnung wo das jetzt genau herkommt. Lange Erfahrung und gesammeltes Wissen über die Jahre eben!

Ich finde es ist alles ausreichend begründet!

Wenn du einen Punkt besonders fragwürdig findest, kann ich dir von mir aus eine Quelle suchen und es noch genauer begründen!

Allerdings gibt es keine Quellen, die die Frage erörtern ob geteiltes Fin nun wirkt oder nicht, weil es totaler Bullshit wäre, dass zu testen. Jeder mit nur einem Minimum an Fachwissen in dieser Richtung weiß das. Es gibt ja auch keine Studien die untersuchen, ob Schüsse ins Herz tödlich sind. So was weiß man eben. Weil da Grundsätzliche Dinge gelten. Das gleiche bei Fin. Getieltes Fin ist nicht anders zu betrachten als andere Wirkstoffe mit ähnlichem Aufnahmemechanismus und chemischer Struktur.

Aber vor allem die Tatsache, dass Tausende geteiltes Fin mit zufriedenstellender Wirkung nehmen sollte eigentlich reichen um zu glauben das geteiltes Fin wirkt wie ungeteiltes!

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Fin](#) on Sun, 18 Oct 2009 13:16:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

okay soweit so gut, ich hab das hier gefunden:

Die Dosierung liegt bei Proscar auch bei 1 Tab pro Tag. Zerkleinern würde ich die nicht! Die Darreichungsform ist eine Filmtablette, deren Polymerüberzug nicht ohne Bewandnis ist! Der Überzug bestimmt den Resorptionsort! Somit wird ev. die Wirkung garnicht eintreten, wenn der Wirkstoff zu früh neutralisiert wird, obgleich ich den Resorptionort nicht genau kenne.

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [stef84](#) on Sun, 18 Oct 2009 13:51:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ari104 schrieb am Sun, 18 October 2009 15:16okay soweit so gut, ich hab das hier gefunden:

Die Dosierung liegt bei Proscar auch bei 1 Tab pro Tag. Zerkleinern würde ich die nicht! Die Darreichungsform ist eine Filmtablette, deren Polymerüberzug nicht ohne Bewandnis ist! Der Überzug bestimmt den Resorptionsort! Somit wird ev. die Wirkung garnicht eintreten, wenn der Wirkstoff zu früh neutralisiert wird, obgleich ich den Resorptionort nicht genau kenne.

Quelle?

Es ist schliechweg falsch! Der Überzug hat nichts mit dem Resorptionsort zu tun.



Die Schutzschicht ist wasserlöslich! Sie ist schon im Magen aufgelöst! Nach dieser Theorie dürfte auch Propecia nicht wirken!  
Probiere es aus. Wirf eine Tablette es in ein Glas Wasser und schau!

Habe ich aber eigentlich alles beschrieben!

---

**Subject:** Finasterd Teilen  
**Posted by** [mesh](#) on Sun, 18 Oct 2009 14:45:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich teile seit 1999 meine Tabletten und wenn man das hochrechnet, habe ich seit dem über 3650 Tablettenstückchen genommen. Seit ich Finasterid nehme, habe ich meine Haarstatus halten können und sie haben sich sogar verdichtet. Ich bin 38 Jahre alt und als ich angefangen hatte, Finasterid zu nehmen, war ich 28 Jahre. Mein Vater hatte schon mit 25 Jahren eine Vollglazte und mein Bruder, der 5 Jahre jünger ist, hat auch kaum noch Haare auf dem Kopf. Ich selber hatte Haarausfall, seit ich 20 Jahre alt bin und bin 8 Jahre nicht ohne Baseballkappe aus dem Haus. Ich kann für mich sagen, mir hat es sehr geholfen und sehe da nichts negatives. Dazu nehme ich nun seit 3 Monaten Minoxidil und die kahlen Stellen sind jetzt richtig dicht geworden. Ich würde sogar empfehlen, beides zu nehmen.

---

**Subject:** Re: Finasterd Teilen  
**Posted by** [eragon](#) on Sun, 18 Oct 2009 17:52:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

**Subject:** Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!  
**Posted by** [Markus91](#) on Mon, 19 Oct 2009 12:23:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hier wird permanent von geteiltem proscar gesorpchen..  
propecia tabs kann man doch auch ruhigen gewissens teilen, oder ??

---

**Subject:** Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!  
**Posted by** [mesh](#) on Mon, 19 Oct 2009 12:24:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nun ja, warum sollte man Propecia teilen? ist da nicht immer nur 1 Mg Finasterid enthalten?

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Markus91](#) on Mon, 19 Oct 2009 12:28:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

richtig, aber ich will auf 0,5mg reduzieren und hab noch ne packung propecia hier liegen. nach verbrauch hab ich vor zu wechseln. also bleibt die wirkung erhalten?

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Christian24](#) on Mon, 19 Oct 2009 12:42:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Markus91 schrieb am Mon, 19 October 2009 14:23 hier wird permanent von geteiltem proscar gesorpchen..

propecia tabs kann man doch auch ruhigen gewissens teilen, oder ??

Sicher kannst es teilen! Is genau dasselbe!

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Jophiel](#) on Sat, 26 Dec 2009 17:15:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielen Dank für deine Mühe!!!

Dieser Beitrag sollte unbedingt ganz an den Anfang der Forums über Fin.

---

Subject: Re: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Mona](#) on Sun, 27 Dec 2009 09:16:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jophiel schrieb am Sat, 26 December 2009 18:15 Dieser Beitrag sollte unbedingt ganz an den Anfang der Forums über Fin.

Aber dieser Beitrag steht doch schon die ganze Zeit ganz oben im Unterforum "Finasterid / Dutasterid" - sogar dauerhaft angeheftet...

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Silent Blood](#) on Sun, 06 May 2012 23:05:24 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das musste mal gesagt werden. Genau meine Vermutung!

Habe allerdings noch gehört, dass man die Tabletten nicht teilen und dann aufbewahren soll. Ist das haltbar?

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [eragon](#) on Mon, 07 May 2012 09:07:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich mache mir immer einen 30 Tage Vorrat und habe kein Problem damit. Wenn du sicher gehen willst, teile eben nur eine.

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Haar2O](#) on Mon, 07 May 2012 20:12:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe meine erste Fin Lieferung auch auf Vorrat geteilt und die einzelnen Teile dann in NEM-Kapseln verfrachtet (Tipp von Eragon). Die liegen dort schon seit Monaten und Wirkung ist geblieben.

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [furiousfuriousfurious](#) on Thu, 17 Jan 2013 15:42:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gibt es denn auch gerüchte über dauerhafte Impotenz?

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Tento](#) on Wed, 06 Mar 2013 10:20:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Leute!

Ich hab mir mal den Finasterid Thread durchgelesen und bin ein wenig verwirrt.

Wie kann ich denn nur 0.5 mg nehmen oder 0.25mg? Wirkt das dann noch überhaupt? Mein Hautarzt meinte, 1MG sollte ich nehmen.

Ich rechne mir das so aus

---

Wenn ich 100% Haarausfall habe und 1MG die 100% stoppen kann, machen 0.5Mg, 50% weniger Haarausfall, als 100%v -\_-

Ich rechne falsch richtig?

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Mallediver](#) on Wed, 06 Mar 2013 10:26:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hier gab es mal ein Diagramm, das die Wirkung glaub ich so beschrieb;

0,5 kommen zu 90% an die 1mg Wirkung heran. Bei 0,25 sieht es dann schon wieder anders aus.

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [schutzgeist](#) on Wed, 06 Mar 2013 12:32:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tento schrieb am Wed, 06 March 2013 11:20Hi Leute!

Ich hab mir mal den Finasterid Thread durchgelesen und bin ein wenig verwirrt.

Wie kann ich denn nur 0.5 mg nehmen oder 0.25mg? Wirkt das dann noch überhaupt?  
Mein Hautarzt meinte, 1MG sollte ich nehmen.

Ich rechne mir das so aus

Wenn ich 100% Haarausfall habe und 1MG die 100% stoppen kann, machen 0.5Mg, 50% weniger Haarausfall, als 100%v -\_-

Ich rechne falsch richtig?

ehm nicht ganz.

1mg senkt DHT in der Kofhaut um 60 %

0.5mg senkt DHT in der Kopfhaut auch um die 60%

0.25 mg senkt DHT in der Kopfhaut wieder weniger %

Wie genau die Wirkung ist entscheidet ab wie viel DHT in der Kopfhaut deine Haare beginnen "auszufallen". Bei dem einen reicht es nur 30 % von DHT zu senken. Dem anderen reichen nichtmal 1mg also 60%.

Zusätzlich sind die verschiedenen Haarareale mit der Zeit unterschiedlich empfindlich.

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Tento](#) on Wed, 06 Mar 2013 13:32:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die Antwort

Komisch dennoch, obwohl ich auf 0.5 runtergeschraubt habe, ich IMMER noch extreme Benommenheit habe.

Hat das denn hier echt niemand?

Ich fühle mich wie , als wenn ich nichts richtig wahrnehmen könnte..

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Minimalbehaarung](#) on Wed, 06 Mar 2013 15:09:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenns vom Fin kommt, lass es doch sein, bringt dir doch auch keine Besserung wenn das Symptom jemand anderes hier auch hat, oder?

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Wed, 06 Mar 2013 15:21:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tento schrieb am Wed, 06 March 2013 14:32: Danke für die Antwort

Komisch dennoch, obwohl ich auf 0.5 runtergeschraubt habe, ich IMMER noch extreme Benommenheit habe.

Hat das denn hier echt niemand?

Ich fühle mich wie , als wenn ich nichts richtig wahrnehmen könnte..

Japp, kenn ich...nennt sich "Brainfog" bist da nicht der einzige. Manche haben es auch noch nach dem Absetzen beim Post-Finasteride Syndrome. Hat damit zu tun, dass Fin auch einige Neurosteroid senkt. Jeder reagiert anders. Ich persönlich halte eine solche NW für nicht tragbar und gehört zudem in den BPZ. Dosis weiter senken, oder am besten ganz weg mit dem Zeug.

Brainfog und Finasterid:

Dr. Alan Jacobs, Neuroendokrinologie NY

---

<http://blog.alanjacobsmd.com/alan-jacobs-mds-blog/2010/06/the-plot-thickens-along-with-the-hair-when-you-mess-with-dihydrotestosterone.html>

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Wed, 06 Mar 2013 16:15:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mr.Goodkat schrieb am Wed, 06 March 2013 16:21

Brainfog und Finasterid: [/b]

Dr. Alan Jacobs, Neuroendokrinologie NY

<http://blog.alanjacobsmd.com/alan-jacobs-mds-blog/2010/06/the-plot-thickens-along-with-the-hair-when-you-mess-with-dihydrotestosterone.html>

hmm und gilt dann hier auch die 30-tägige Halbwertszeit also bis die Neurostereoide wieder neu gebildet werden?

Deckt sich dann aber auch nicht mit manchen Kommentaren da, da einige bereits wenige Tage nach absetzen eine Verbesserung in Richtung Brainfog berichten.

Wie gesagt hier vermischen sich wieder Placeboeffekte?

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Tento](#) on Wed, 06 Mar 2013 16:54:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

danke für die antworten!

Nun weiss ich mehr...

Bei mir war das Brainfog GANZ schlimm...

Ich war heute wieder so, als wäre ich Superman und würde die Welt vom ALL betrachten! So schlimm war das. Diese nebenwirkung hielt sogar 2 Tage lang an und das ganz OHNE FIN!!!

Morgen wenn Brainfog weg ist, probiere ich 0,25... bin mal gespannt..

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Thu, 07 Mar 2013 13:23:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Wed, 06 March 2013 17:15Mr.Goodkat schrieb am Wed, 06 March 2013 16:21

Brainfog und Finasterid: [/b]

Dr. Alan Jacobs, Neuroendokrinologie NY

<http://blog.alanjacobsmd.com/alan-jacobs-mds-blog/2010/06/the-plot-thickens-along-with-the-hair-when-you-mess-with-dihydrotestosterone.html>

hmm und gilt dann hier auch die 30-tägige Halbwertszeit also bis die Neurosteroide wieder neu gebildet werden?

Deckt sich dann aber auch nicht mit manchen Kommentaren da, da einige bereits wenige Tage nach absetzen eine Verbesserung in Richtung Brainfog berichten.

Wie gesagt hier vermischen sich wieder Placeboeffekte?

ehm..... und täglich grüßt das Murmeltier? guckst du hier, wurde dir jetzt schon 2 mal geschrieben und nicht nur von mir.

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/22793/257796/#msg\\_257796](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/22793/257796/#msg_257796)

ist sogar ein rap.... lol

Placeboeffekte? Guckst du hier:

[http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/22816/257822/#msg\\_257822](http://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/22816/257822/#msg_257822)

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [knopper22](#) on Thu, 07 Mar 2013 15:10:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ok ok aber evt. können wir uns dann darauf einigen, das ein erheblicher Teil Placeboeffekt ist aber halt nicht alles.

Aber alles direkt auf die Blockung der 5 AR-2 die 5 AR-3 bzw. die DHT-Reduktion zurückzuführen ist sicherlich auch nicht richtig.

So hört es sich ja bei dir immer an. Wie gesagt man durchaus ohne dieses Enzym, bzw. ohne DHT ganz normal leben.

Mio nicht NW'ler sind der Beweis!

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Fri, 08 Mar 2013 17:22:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Thu, 07 March 2013 16:10ok ok aber evt. können wir uns dann darauf einigen, das ein erheblicher Teil Placeboeffekt ist aber halt nicht alles.

Aber alles direkt auf die Blockung der 5 AR-2 die 5 AR-3 bzw. die DHT-Reduktion zurückzuführen ist sicherlich auch nicht richtig.

So hört es sich ja bei dir immer an. Wie gesagt man durchaus ohne dieses Enzym, bzw. ohne DHT ganz normal leben.

Mio nicht NW'ler sind der Beweis!

Wir einigen uns auf gar nichts, denn zum einen wäre es ein Nocebo. Zum anderen Reden wir hier immer wieder von einem Teil der NW der auch in der Packungsbeilage stehen, da kann man noch so viele Ärzte kaufen, die das Gegenteil schreiben.

Fakt ist, jedoch und auch das habe ich mehr als nur einmal geschrieben und auch du mehr als nur einmal gelsen, was ja deine Antworten zeigen, dass Finasterid zu bleibenden NW führen kann, über die Menge der betroffenen Menschen kann man keine Aussage machen, denn es gibt auch einige, die Fin viele Jahre ohne Probleme genommen haben und erst diese Problem nach dem Absetzen bekommen haben. Die Menge an Pat., die es ohne Probleme nehmen ist sehr hoch und die mit bleibenden NW sehr gering, jedoch gibt es dieses Risiko.

Die Aussage, mann kann ohne dieses Enzym leben ist.... na ja.. guck dir die Leute an, die ohne dieses Enzym auf die Welt kommen.

Die Frage ist, wie lange kann der Körper ohne dieses Enzym auskommen?

10 Jahre? 15 Jahre? So nach dem Motto: Hey ich rauche 10 Jahre und habe keinen Lungenkrebs, Rauchen macht gar keinen Lungenkrebs....Millionen rauchen ja schon 10 Jahre und haben keinen. Der Beweis!!!

Was für ein super Beweis! Es Beweist gar nichts.

Wir haben dieses Enzym nicht als Deko im Körper. So gut wie Alles an und in uns hat und macht einen Sinn. Die Evolution hat sich schon was dabei gedacht.

<http://de.wikipedia.org/wiki/Steroid-5%CE%B1-Reduktase>

Das Thema dieses Threads ist ein völlig Anderes und hat hiermit nicts aber auch gar nichts zu tun. Wenn aus diesem Thread wieder ein NW Fin thread wird kann ich echt verstehen, warum sich manche ärgern.

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Tento](#) on Sat, 09 Mar 2013 09:41:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---



mir ist immer noch benommen von Finasterid ;( Obwohl ich die jetzt schon seid 4 Tagen nicht mehr nehme

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sat, 09 Mar 2013 12:22:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tento schrieb am Sat, 09 March 2013 10:41 mir ist immer noch benommen von Finasterid ;( Obwohl ich die jetzt schon seid 4 Tagen nicht mehr nehme

Mach dir echt keine Sorgen, die 5AR wird in den nächsten Tagen und wochen wieder steigen und dir geht es bestimmt bald wieder besser. sätestens in ca 4-5 wochen sollte Alles wieder gut sein, vielleicht gehts viel schneller oder dauert noch etwas. Wenns "nur" diese Benommenheit ist, geht das ganz bestimmt bald wieder weg. Jetzt ist wichtig, mach dich nicht verrückt.

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Gabbyjay](#) on Mon, 12 Jun 2017 11:47:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Heute hat mir wieder eine Apothekerin gesagt, dass bei geteilten Tabletten, die nicht für Teilung vorgesehen sind, in der einen Hälfte mehr (oder sogar der komplette) Wirkstoff enthalten sein kann und in der anderen weniger (oder sogar gar kein) Wirkstoff.

Was stimmt nun? ^^

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [Shibalnu](#) on Mon, 12 Jun 2017 12:18:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Unsinn.

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [peci123](#) on Mon, 12 Jun 2017 12:29:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gabbyjay schrieb am Mon, 12 June 2017 13:47 Heute hat mir wieder eine Apothekerin gesagt, dass bei geteilten Tabletten, die nicht für Teilung vorgesehen sind, in der einen Hälfte mehr (oder sogar der komplette) Wirkstoff enthalten sein kann und in der anderen weniger (oder sogar gar kein) Wirkstoff.

Was stimmt nun? ^^

---

....dass die Apothekerin absolut inkompetent ist

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [andal](#) on Mon, 12 Jun 2017 15:08:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

peci123 schrieb am Mon, 12 June 2017 14:29 Gabbyjay schrieb am Mon, 12 June 2017 13:47 Heute hat mir wieder eine Apothekerin gesagt, dass bei geteilten Tabletten, die nicht für Teilung vorgesehen sind, in der einen Hälfte mehr (oder sogar der komplette) Wirkstoff enthalten sein kann und in der anderen weniger (oder sogar gar kein) Wirkstoff.

Was stimmt nun? ^^

....dass die Apothekerin absolut inkompetent ist

... und selbst wenn, es kein beinbruch ist da spiegelmedikament..

falls dennoch schlaflose nächte, propecia 1 mg/d/eod, fertig

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [HenryMiller](#) on Mon, 12 Jun 2017 15:30:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gabbyjay schrieb am Mon, 12 June 2017 13:47 Heute hat mir wieder eine Apothekerin gesagt, dass bei geteilten Tabletten, die nicht für Teilung vorgesehen sind, in der einen Hälfte mehr (oder sogar der komplette) Wirkstoff enthalten sein kann und in der anderen weniger (oder sogar gar kein) Wirkstoff.

Was stimmt nun? ^^

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [screw](#) on Sun, 16 Dec 2018 16:31:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielleicht noch eine passende Frage hierzu:

Kann man abgelaufenes Finasterid nehmen?

Ich habe noch eine große Packung Filmtabletten deren MHD der 09/15 ist.

(Hatte es zwei Mal über mehrere Wochen in kleinen Dosen probiert und direkt ein

unangenehmes ziehen im Hoden verspürt)

Nun würde ich es noch einmal angehen, da Minox only anscheinend mehr Schaden machen soll....

---

---

Subject: Aw: Anfänger- bitte lesen: Gerüchte zu geteiltem Finasterid!

Posted by [xWannes](#) on Sun, 16 Dec 2018 16:49:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

screwer schrieb am Sun, 16 December 2018 17:31Vielleicht noch eine passende Frage hierzu:

Kann man abgelaufenes Finasterid nehmen?

Ich habe noch eine große Packung Filmtabletten deren MHD der 09/15 ist.

(Hatte es zwei Mal über mehrere Wochen in kleinen Dosen probiert und direkt ein unangenehmes ziehen im Hoden verspürt)

Nun würde ich es noch einmal angehen, da Minox only anscheinend mehr Schaden machen soll....

Allein Minoxidil zu nehmen macht zwar keinen Schaden, bei nicht extrem unsachgemäßer Lagerung ist jedoch auch das abgelaufene Finasterid noch gut verwendbar.

Mir hat neulich auch meine Dermatologin-in-FA-Ausbildung-Schwester ca. 60 Tabs 1mg-Finasterid, das abgelaufen ist, zugesteckt. Das verwende ich natürlich ebenfalls noch.

---