
Subject: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [indianlee](#) on Tue, 13 Jan 2009 02:49:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich habe nun (sieh thread) kaum 2 Monate sogar mit Unterbrechungen FIN 0.25mg und 0.5mg genommen.

Seit einigen Tagen spüre ich deutlich ein Ziehen und manchmal auffallendes Kribbeln in der linken Brust, das ich mir auch nicht mehr einbilde.

Um es ehrlich zu sagen: ich bin verzweifelt, meine letzte Hoffnung ist dahin.

Bevor ich über Topisch oder Spiro etc. nachdenke: Was würdet Ihr jetzt in meinem Fall tun?? Sofort absetzen?

Danke.
Lee

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [Amsch](#) on Tue, 13 Jan 2009 03:29:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zum Arzt gehen, über Finasterid erzählen und nachfragen. Wenn das ziehen nicht aufhört, absetzen!

Ich hoffe du hast einen halbwegs guten Hausarzt (hatte ich leider noch nie lol)

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [Rebel](#) on Tue, 13 Jan 2009 20:16:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn du in den ersten zwei Monaten noch nicht mal in der Lage bist, die Tabletten täglich einzunehmen, dann kannst du es eigentlich gleich lassen ...

Was das Ziehen in der Brust angeht: weiter beobachten (Brustwarzen sensibel, trotz anspannen der Brust schwabbelig usw.), wenns nicht besser wird, einen Arzt aufsuchen ...

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [Helveticus](#) on Wed, 14 Jan 2009 00:03:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn der Arzt pro Fin ist, wird er sagen, du sollst es weiternehmen. Wenn der Arzt contra Fin ist, wird er sagen, dass du sofort damit aufhören sollst...

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [indianlee](#) on Sun, 18 Jan 2009 14:47:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

na ja was heißt "in der Lage"? Ich habe experimentiert, wie und ob definitiv eine Auswirkung auf die Erektion zu spüren ist. Daher habe ich einmal für ca. 1 Woche abgesetzt und nach ca. 5-6 Tagen die normale Libido und Erektion wieder gehabt. Nach Beginn wieder stark eingeschränkt.

Meine Frage bleibt: Ist jedes Ziehen und leicht vergrößerte Brust auf einer Seite mit einer beginnenden Gyno gleich zu setzen?? Sollte ich deshalb sofort aufhören?

Meine Ärztin wird nicht viel Ahnung von dem Thema haben, da bin ich sicher, leider.

Danke für Eure Hilfe,
Lee

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [soopaman](#) on Wed, 21 Jan 2009 14:30:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nach 5-6 tagen normale libido und kurz nach einnahme wieder eingeschränkt? klingt für mich eher nach einer kopfsache.

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [Balle](#) on Wed, 28 Jan 2009 13:07:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Klingt für mich auch nach einer Kopfsache, kribbeln und ziehen in der Brustwarze kann man sich auch sehr gut einbilden, war bei mir auch so, wenn du solche Angst vor Verweiblichung und Impotenz hast, warum überlegst du dann Spiro zu nehmen? was ja ein Antiandrogen ist, also

noch viel krasser als Fin.

Subject: Re: kaum 2 Monate : Schmerzen Ziehen in der Brust?! Was nun?

Posted by [vermouth](#) on Fri, 30 Jan 2009 16:24:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmm klingt nach einer beginnenden Gyno. Gyno ist schwer reversibel.

Wenn dir das Aussehen deines Oberkörpers lieb ist, setz es sofort ab und mach einen Termin beim Arzt bzw Endokrinologen aus.

Selbst eine leichte Gyno (Igelnasen/geschwollene Nippel sehen imho blöd aus).

Mit Fin kannst du auch wieder starten (im Falle eines negativen Befundes) nachdem du dir beim Arzt Ultraschall bzw Blutwerte hast ermitteln lassen.

Balle: Er meinte Spiro topisch. In den 2-3 Studien die zum Thema topischen Spiro gemacht wurden, wirkte es nicht systemisch.
