

---

Subject: Prostatakrebs und Nebenniere

Posted by [tristan](#) on Sat, 04 Mar 2006 16:40:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Auch nicht wirklich neu, aber hier sieht man nochmal dass die Nebennierenandrogene eine große Rolle spielen bei Prostatakrebs.

Bei Haarausfall und AKne ist die Rolle ja auch bekannt...

Int Urol Nephrol. 2006;38(1):33-44.

Prostate cancer risk: the significance of differences in age related changes in serum conjugated and unconjugated steroid hormone concentrations between arab and caucasian men.

Kehinde EO, Akanji AO, Memon A, Bashir AA, Daar AS, Al-Awadi KA, Fatinikun T.

Faculty of Medicine, Department of Surgery, Kuwait University, P.O. Box 24923, 13110, Safat, Kuwait, ekehinde@hsc.edu.kw.

...Caucasians have significantly higher serum levels of the precursor androgens DHEAS and ADT especially in early adulthood compared to Arab men. These observations of low circulating androgens and their adrenal precursors in Arab men may partially account for the decreased risk for prostate cancer among Arab men.

Da frage ich mich wieder woher die Ärzte ihre Normwerte für DHEA-S und Androstendion nehmen...