
Subject: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?
Posted by [Minasterid](#) on Fri, 02 Oct 2009 22:05:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nehme jetzt seit etwas über einer Woche Finasterid (Propecia 1mg Tabletten). Schon bei der allerersten Tablette, die ich vor ca. 3 Wochen eingenommen hatte (danach 2 Wochen pausiert weil Freundin nun ins Ausland ist für 6 Monate und ich keine Erektionsstörungen riskieren wollte) hatte ich etwas Hodenziehen aber vor allem empfindliche Brustwarzen und Brustziehen. Als ich jetzt vor einer Woche angefangen hatte Propecia täglich zu nehmen habe ich von der Brustwarzenempfindlichkeit nichts mehr gespürt (und wenn nur sehr leicht), aber das Brustziehen ist geblieben (wenn auch mittlerweile leichter).

Ich wollte nun wissen, ob es vielleicht Erkenntnisse gibt, dass diejenigen, welche die Nebenwirkung Brustziehen verspüren unter erhöhter Gyno Gefahr schweben? Alle anderen NW kann ich nicht feststellen. Keine niedrigere Libido oder Erektionsfähigkeit, kein Brain Fog, nix mit den Augen, etc..

Da ich eh schon ein bißchen "Igelschnäützchen" Brust habe habe ich eigentlich nur vor einer Gyno wirklich Angst.

Subject: Re: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?
Posted by [Amsch](#) on Fri, 02 Oct 2009 23:32:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, kann sich um Brustvergrößerung handeln, wird aber erst nach paar Monaten sichtbar. Am besten den Arzt fragen ob er einen Hormontest machen kann um DHT, Testo und Östrogen zu überprüfen!

Subject: Re: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?
Posted by [Helveticus](#) on Sat, 03 Oct 2009 09:38:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du hast nach der ersten Tablette Hodenziehen bekommen? Gratulation zu der Einbildung.

Vor einer Gyno habe ich auch Angst, ist bei mir auch das Einzige an NW. Hormontest kannst du gleich weglassen, bringt überhaupt nichts. Bei Werten nicht in der Norm, also z.B. zu viel Östrogen, wird man meistens eine Gyno bekommen, aber du kannst auch völlig normale Hormonwerte haben und trotzdem eine Gyno bekommen, dies ist bei den meisten Fällen der Fall.

Subject: Re: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?
Posted by [Minasterid](#) on Sat, 03 Oct 2009 10:19:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helveticus schrieb am Sat, 03 October 2009 11:38 Du hast nach der ersten Tablette Hodenziehen bekommen? Gratulation zu der Einbildung.

Vor einer Gyno habe ich auch Angst, ist bei mir auch das Einzige an NW. Hormontest kannst du gleich weglassen, bringt überhaupt nichts. Bei Werten nicht in der Norm, also z.B. zu viel Östrogen, wird man meistens eine Gyno bekommen, aber du kannst auch völlig normale Hormonwerte haben und trotzdem eine Gyno bekommen, dies ist bei den meisten Fällen der Fall.

Ja es gab Hoden- und Brustziehen schon nach der ersten 1mg Tablette. Aber ob du es glaubst oder nicht ist auch zweitrangig. Die anderen NW sind ja bei mir nicht aufgetreten, insbesondere nicht die Erektionsstörungen und vor dieser hatte ich Befürchtungen, nicht vom Brust- oder Hodenziehen. Außerdem habe ich hier auch oft gelesen, dass gerade das Brust- und Hodenziehen in den ersten 2 Wochen auftreten und dann verschwinden (so in etwa ist der Verlauf ja auch bei mir), insofern ist das nach der ersten Tablette auch gar nicht unwahrscheinlich.

Subject: Re: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?

Posted by [Mink](#) on Sat, 03 Oct 2009 10:28:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach 1 Propecia gibt es definitiv NULL Wirkung und NULL Nebenwirkung
Alles Einbildung.

Subject: Re: Ziehen in der Brust erhöhte Gynogefahr?

Posted by [Balle](#) on Mon, 05 Oct 2009 08:58:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=Helveticus schrieb am Sat, 03 October 2009 11:38]Du hast nach der ersten Tablette Hodenziehen bekommen? Gratulation zu der Einbildung.

Das sagt ja gerade der Richtige, bist doch der mit der fetten Plauze und den muskulösen Oberarmen, oder?
