
Subject: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [herO](#) on Tue, 02 Feb 2010 19:59:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

ich nehm seit 12 Tagen 1 mg Finasterid weil meine Geheimratsecken deutlich und immer größer werden (bin 21 Jahre alt). Allerdings habe ich jetzt ein Problem was ich vor der Einnahme schon befürchtet habe, und zwar das sich bei mir wohl langsam eine Gyno entwickelt. Hatte damals in der Pubertät schon eine Gyno die auch erst recht spät zurück gegangen ist. Bei mir kribbelt/sticht/und juckt es unter der linken Brustwarze und ich erkenne auch schon eine leichte Wölbung. Es ist ausgeschlossen das ich mir zu viel Gedanken darüber mache und ich es mir einbilde, ich kann euch sagen es zieht und kribbelt in echt. Meine Frage ist jetzt, ob ich absetzen soll (das wäre sehr schlimm für mich, weil die Haare sonst echt rieseln^^) oder ob ich erst einmal auf 0,5 mg runter gehe und abwarte, evtl wenn es dann nicht besser wird absetzen nach 1-2 Wochen und nach Rückgang der Gyno noch einmal mit 0,5 mg anzufangen. Ich kann aber jetzt schonmal sagen das in den knapp 14 Tagen der Haarausfall schon besser geworden ist, ich kann so durch die Haare fassen ohne das ich immer gleich 3 Haare zwischen den Fingern habe.

bitte rasch um eine Antwort.

danke

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [Balle](#) on Wed, 03 Feb 2010 09:49:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

herO schrieb am Tue, 02 February 2010 20:59: Hallo Leute,

ich nehm seit 12 Tagen 1 mg Finasterid weil meine Geheimratsecken deutlich und immer größer werden (bin 21 Jahre alt). Allerdings habe ich jetzt ein Problem was ich vor der Einnahme schon befürchtet habe, und zwar das sich bei mir wohl langsam eine Gyno entwickelt. Hatte damals in der Pubertät schon eine Gyno die auch erst recht spät zurück gegangen ist. Bei mir kribbelt/sticht/und juckt es unter der linken Brustwarze und ich erkenne auch schon eine leichte Wölbung. Es ist ausgeschlossen das ich mir zu viel Gedanken darüber mache und ich es mir einbilde, ich kann euch sagen es zieht und kribbelt in echt. Meine Frage ist jetzt, ob ich absetzen soll (das wäre sehr schlimm für mich, weil die Haare sonst echt rieseln^^) oder ob ich erst einmal auf 0,5 mg runter gehe und abwarte, evtl wenn es dann nicht besser wird absetzen nach 1-2 Wochen und nach Rückgang der Gyno noch einmal mit 0,5 mg anzufangen. Ich kann aber jetzt schonmal sagen das in den knapp 14 Tagen der Haarausfall schon besser geworden ist,

kann garnicht sein

ich kann so durch die haare fassen ohne das ich immer gleich 3 haare zwischen den fingern habe.

bitte rasch um eine antwort.

danke

Kannst es ja mit 0,5 mg versuchen, aber da du ja in der Pubertät schon eine Gyno hattest, scheinst du wohl zur Risikogruppe zu gehören, hast du das deinem Arzt nicht erzählt?

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [masqe](#) on Wed, 03 Feb 2010 12:18:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube nicht das man nach so wenig Zeit (14 Tage Fin?!) so extreme Veränderungen feststellen kann...ich würde es wie gewohnt weiternehmen und beobachten. Du achtest nun extrem auf körperliche Veränderungen und bist viel sensibler weil alle Welt hier Panik vor Nebenwirkungen macht!

Es gibt Menschen denen brennt das Haus ab und fin ist Schuld...also keine Panik...abwarten und Tee trinken Am besten grünen Tee

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [Teardrops](#) on Wed, 03 Feb 2010 15:04:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich kann selbst bestätigen das die meisten nw einbildung sind war bei mir auch so. einfach weitermachen und am besten sich erstmal vom forum fernhalten hat bei mir wunder bewirkt.

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [jochenknochen](#) on Wed, 03 Feb 2010 16:00:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich zwar nicht vorgelastet, aber hatte auch leichet NW die wieder verschwunden sind. Irgendwann im 2 o. 3 Monat hatte ich ca. ne Woche Hodenziehen (nur links) und im 4. Monat hatte ich ca. eine Woche Burstscherzen (nur rechts), was aber auch ne Verspannung oder sowas gewesen sein könnte.

Nun bin ich im 5. Monat FIN (1mg) und habe zurzeit weder NW noch irgendwelche positive Wirkung.

WOLLte es definitiv 1 Jahr durchziehen und dann ein Resümee ziehen.

mfg

J.K.

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [herO](#) on Wed, 03 Feb 2010 16:20:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

danke für die antworten...also vom forum fernhalten ist glaube ich eine gute idee obwohl ich erst durch meine beschwerden auf dieses forum gestoßen bin, habe vorher noch nicht hier reingeschaut und auch nirgendwo anders. ich werde erst einmal mit der 1 mg dosis fortfahren und wenn keine besserung eintritt auf 0,5 mg gehen.

und das man nach 2 wochen schon weniger haare verliert...also es ist meine wahrnehmung...vorher konnte ich mir weder die haare föhnen noch durch meine haare gehen ohne das sich haare gelöst haben...vllt ist zur zeit auch einfach wieder eine phase wo ich generell weniger haare verliere. ich werde mal abwarten.

aber soweit ich weiß setzen die nw's häufig recht schnell ein, also nicht erst nach einem halben jahr oder so, sondern innerhalb von 2-4 wochen. wie gesagt ich werde erst einmal weiter machen

danke für die antworten...wenn noch jmd einen guten ratschlag hat einfach schreiben;)

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [HirschGeweih](#) on Wed, 03 Feb 2010 19:43:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Teardrops schrieb am Wed, 03 February 2010 16:04ich kann selbst bestätigen das die meisten nw einbildung sind war bei mir auch so.
einfach weitermachen und am besten sich erstmal vom forum fernhalten hat bei mir wunder bewirkt.

Sehe ich auch so. Ich sag ja nur NLP, der artzt der mit destiliertem wasser 70%seiner patienten mit blutendem magengeschwür behandelt hatte(so stark kann der placebo effekt sein)

Subject: Re: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [sir-shed-a-lot](#) on Thu, 04 Feb 2010 20:58:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wenn du eine gyno hast, dann hast du automatisch auch mehr östrogen im blut.
Das ist anscheinend auch nicht besonders gut für GHEs.
