
Subject: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [nrwler](#) on Wed, 23 Nov 2011 15:36:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo - ich habe Finastrid Gel zweimal angewand und spüre seit dem einen Libidoverlust und habe Erektionsprobleme. Die Anwendung ist nun bereits 8 Wochen her - ist dies möglicherweise auf Finasterid zurückzuführen oder??

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [Foxy](#) on Wed, 23 Nov 2011 18:01:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann ich mir nicht vorstellen?

benutzt du sonst noch was gegen HA?
andere Medikamente?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [nrwler](#) on Wed, 23 Nov 2011 18:06:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein, ansonsten nichts - aber es trat unmittelbar also am Tag nach der Anwendung auf...!?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [Foxy](#) on Wed, 23 Nov 2011 18:10:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und jetzt immer noch komisch
und topisch auch noch

keine Ahnung ob bei dieser Minidosierung sowas sein kann

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [Mink](#) on Wed, 23 Nov 2011 18:33:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nrwler schrieb am Wed, 23 November 2011 19:06Nein, ansonsten nichts - aber es trat unmittelbar also am Tag nach der Anwendung auf...!?

Kommt nicht von Fin. So schnell - 100% unmöglich ! Bis sich die DHT-Blockade auf die Libido u. Erektion auswirken kann, das ist ein langer Prozess. Genauso wie es unmöglich ist, dass nach der ersten Einnahme sofort der HA stoppt, genauso wie es unmöglich ist, dass nach Absetzen sofort die Haare wieder ausfallen, genauso wie es unmöglich ist, dass nach Absetzen sofort die NW verschwinden.

Libido und Erektion sind zwei hochsensible Gebilde, die vom Zusammenspiel vieler Faktoren abhängig sind. Nichts desto trotz KANN Fin auf beides einen negativen Einfluss haben - aber nicht nach der ersten Einnahme.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [nrwler](#) on Thu, 24 Nov 2011 07:57:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann sein, dass es auch zwei oder drei Tage gedauert hat - aber jedenfalls war es kurz nach der Anwendung...

Ist denn die topische Anwendung weniger mit Nebenwirkungen behaftet als die orale?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [Mink](#) on Thu, 24 Nov 2011 11:09:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nrwler schrieb am Thu, 24 November 2011 08:57 Kann sein, dass es auch zwei oder drei Tage gedauert hat - aber jedenfalls war es kurz nach der Anwendung...

Ist denn die topische Anwendung weniger mit Nebenwirkungen behaftet als die orale?

Es dauert minimum Wochen oder eher Monate !

Ja, bei topisch sind geringere NW, speziell im Bereich unter der Gürtellinie, zu erwarten als bei oral. Leute mit Augenproblemen hingegen fahren mit topisch schlechter.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [nrwler](#) on Thu, 24 Nov 2011 11:30:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Mink,

im wie weit ist das sicher, dass es wenn erst nach Wochen/Monaten auftritt und das die Nebenwirkungen bei topischer Anwendung geringer ausfallen??

Was ich unter probeciahelpe lese ist nicht wirklich beruhigend...

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [Mink](#) on Thu, 24 Nov 2011 11:55:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nrwler, wenn ich Dir einen wirklich guten Tip geben kann, vergiss propecia-help ! Das sind Verrückte, Hypochonder und einer macht den anderen verrückt. Weißt Du, wieviel Millionen Leute Fin nehmen ? Aber von denen, die keinerlei NW haben, schreibt kein Mensch irgendwas in einem Forum. Warum auch ? Nur die mit vermeintlichen Problemen weinen sich aus und dann bekommt man einen völlig verfälschten Eindruck. Das gleiche in abgeschwächter Form spielt auch hier im Forum ab.

Ich selbst nehme seit 14 Jahren Fin, verfolge seitdem dieses Thema und kann mir ein Urteil erlauben.

Du must bei dir selbst testen, wie du damit klar kommst, welche Wirkung und/oder ggf. NW du hast, ob dir topisch oder oral mehr liegt. Je mehr man sich von anderen irritieren lässt umso mehr wird die eigene Wahrnehmung beeinflusst.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [eragon](#) on Thu, 24 Nov 2011 12:12:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich meine mich an einen Poster zu erinnern, der nur Probleme mit der Libido hatte wenn beim Sex noch mindestens eine weitere Person beteiligt war . Hat er selbst an sich rumgespielt, war alles ok. Trotzdem hat er das auf Fin geschoben. Ist ja auch bequem

Ich kann Mink nur Recht geben. Da ist eher der Kopf die Ursache.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [nrwler](#) on Thu, 24 Nov 2011 12:15:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

OK, das ist schon klar - ich hoffe ja sozusagen auch, dass es einzig ein psychischer Aspekt ist...

Trotzdem suche ich nach Informationen ob die Nebenwirkungen nach so kurzer Zeit überhaupt eintreten können!? Reicht theoretisch eine Tablette...?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [eragon](#) on Thu, 24 Nov 2011 12:59:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein. Und je mehr du dich damit beschäftigst, umso größer wird dein Problem.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [Mink](#) on Thu, 24 Nov 2011 14:24:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nrwler schrieb am Thu, 24 November 2011 13:15OK, das ist schon klar - ich hoffe ja sozusagen auch, dass es einzig ein psychischer Aspekt ist...

Trotzdem suche ich nach Informationen ob die Nebenwirkungen nach so kurzer Zeit überhaupt eintreten können!? Reicht theoretisch eine Tablette...?

Wie oft wünschst du auf diese Frage noch eine Antwort ?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [nrwler](#) on Thu, 24 Nov 2011 15:15:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

auch wenn ein "nein" schonmal sehr hilfreich ist, eine Erklärung worauf es sich beruht wäre jedoch noch besser.

Danke

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [eragon](#) on Thu, 24 Nov 2011 16:45:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hat Mink doch schon längst beantwortet, es dauert Wochen...

Du hast ein anderes Problem!!!

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [Alibi](#) on Thu, 24 Nov 2011 18:21:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mink schrieb am Thu, 24 November 2011 12:09Es dauert minimum Wochen oder eher Monate !

Würde ich nicht so konkret sagen.

Das typische Hodenziehen zu Fin-Beginn kommt ja auch schon nach 1-2 Tagen.
Dass Fin innerhalb weniger Tage nichts anrichten kann, würde ich jetzt nicht in Stein meißeln.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [nrwler](#) on Fri, 25 Nov 2011 07:39:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Warum sollen denn bei der topischen Anwendung geringere Nebenwirkungen auftreten - auch von dort gelangt der Wirkstoff ins Blut, oder!?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [Teardrops](#) on Fri, 25 Nov 2011 10:28:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja aber nicht die komplette dosis. du bildest dir das ein kann wirklich nicht nach 2 mal sein.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [nrwler](#) on Fri, 25 Nov 2011 11:44:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt es denn Erfahrungen darüber ab welchem Anwendungszeitraum Nebenwirkungen bei oral/topisch zu erwarten sind?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung
Posted by [cane](#) on Fri, 25 Nov 2011 11:57:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nrwler schrieb am Fri, 25 November 2011 12:44Gibt es denn Erfahrungen darüber ab welchem Anwendungszeitraum Nebenwirkungen bei oral/topisch zu erwarten sind?

Kann dir niemand so genau sagen. Nur mit Sicherheit nicht nach einer zweimaligen Anwendung.

Du darfst hier nicht den Fehler machen und auf propeciahelp nach Erfahrungsberichten zu suchen die deinen "scheinbar" gleichen. Damit tust du dir keinen Gefallen und verschlimmerst es nur.

Ich bin ja selbst etwas anfällig was Fin und eventuelle sexuelle NWs angeht. Was schlicht bedeutet ich mache mir zu viele Gedanken. Natürlich ist es gut das Ganze im Auge zu behalten, es darf aber nicht den ganzen Tag bestimmen. Immer locker bleiben !

Arbeite daran, mach Sport, ernähre dich gesund und falls es in ein paar Wochen nicht besser ist: Geh zum Arzt !

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [malle](#) on Fri, 25 Nov 2011 11:58:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde das Ganze auch nicht so ketagorisch ausschliessen....dünnes Sperma und augendruck traten bei mir innerhalb von wenigen Tage auf....

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [nrwler](#) on Fri, 25 Nov 2011 12:26:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oh Mann - der eine schließt es aus, der andere nicht...

Warum "mit Sicherheit nicht nach einer zweimaligen Anwendung"? Woher kommt diese Sicherheit???

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [mike.](#) on Fri, 25 Nov 2011 12:44:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nrwler...

die Meinungen gehen wie so oft um 180 Grad auseinander...
weil jeder schließt von sich auf andere.

jeder ist anders

Bei mir persönlich war es auch so nach ein paar Tagen leichtes Hodenziehen und Brustspannen... Brust im 1-2. Monat minimal gewachsen

verging alles wieder

Edit:

Ich halte es für möglich.....

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [cane](#) on Fri, 25 Nov 2011 12:56:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Erstens: Es gibt eine Studie den Verlauf der DHT-Senkung nach einmaliger Einnahme von verschiedenen Dosen Fin beschreibt. Nach dieser ist der Ausgangspunkt bei 1mg nach ca einer Woche wieder erreicht. Dein DHT-Spiegel war demnach evtl gute 2 Wochen unter normal Niveau? Eine viel zu kurze Zeit (vgl. Mink).

Zweitens: Ich hatte aehnliche Probleme wie Du und musste deshalb auch die Dosis verringern. Vor allem die von Malle beschriebenen NWs kann ich (überwiegend) in der Anfangszeit unterschreiben. Nur, ein wirklich grosser Bestandteil waren psychischer Natur !

Drittens: Sogar Foxi ist skeptisch

Aber hör am besten auf deinen Körper, du kennst dich am besten.

Kopf hoch und mach dir kein Stress !

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [jo1983](#) on Fri, 25 Nov 2011 12:57:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich schliesse es auch aus. nehmen wir jedoch an, die reagierst extrem auf fin. wenn du es zweimal eingenommen hast, sagen wir 1.25mg, kannst du mit dieser menge deinen dht wert schon stark senken (ich nehm jetzt einfach mal an, dass die nw von dht reduktion kommen). allerdings steigt dieser innerhalb von +-7tagen wieder auf ein normales niveau. es ist vollkommen ausgeschlossen, dass du nach kurzer herabsenkung deines wertes eine dauerhaften beeinträchtigung hast, es ist schlichtweg kopfsache. ich bin bin auch kein freund von fin und seh das ganze sehr kritisch und versuche evtl. veränderungen zu beobachten, möglichst objektiv, so schwer das auch ist. nehme seit ca. 2.5mon fin topisch (0.25mg p.d.) und seit ca. 1.5mon zusätzlich fin oral (0.25-0.5mg p.d.), bis auf rote augen konnte ich beim besten willen noch keine nw feststellen, auch nicht so sachen wie druck auf den augen (was auch immer das sein soll), hodenziehen (weiß garnicht wie da der zusammenhang zu fin hergeleitet werden soll..) oder libidoverlust/erektionsprobleme. die sache mit den augen normalisiert sich wieder, vllt war es auch was anderes.

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [nrwler](#) on Fri, 25 Nov 2011 13:09:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ Cane

- Kannst du mir sagen, wo ich diese Studie finden kann?

- Könnte es nicht sein, dass bereits die einmalige Anwendung etwas irreperables auslöst?

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [Foxy](#) on Fri, 25 Nov 2011 14:23:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das Hodenziehen begann bei mir schon ab der ersten
Fin Tab dauerte einige Monate dann war das weg!

aber jetzt hörte es gar nicht mehr auf, jetzt sind es aber
brennende schmerzen im ganzen Unterleib

Foxy

Subject: Aw: Finasterid nach zweimaliger Anwendung

Posted by [nrwler](#) on Fri, 25 Nov 2011 15:23:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wer kann denn etwas zum Zeitfenster der Post Nebenwirkungen sagen.

Nach propeciahelp müsste es ähnlich aussehen!?

- Letzte Einnahme Finasterid
- nächsten 14 Tage Rückgabe DHT (Nebenwirkungen?)
- nächsten 7 Tage Normalzustand (keine Nebenwirkungen?)
- Treten die Post Nebenwirkungen typischerweise einen Monat nach

- a) der letzten Einnahme
- b) nach den 14 Tagen
- c) nach den 21 Tagen

auf?

Subject: @nrwler

Posted by [Mink](#) on Fri, 25 Nov 2011 17:07:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nrwler schrieb am Fri, 25 November 2011 14:09@ Cane

- Kannst du mir sagen, wo ich diese Studie finden kann?
- Könnte es nicht sein, dass bereits die einmalige Anwendung etwas irreperables auslöst?

Doch ! Das ist offenbar passiert bei dir ! Siehe Link.

<http://de.wikipedia.org/wiki/Hypochondrie>

Ich geb dir nen Tip: Lass es ! So überängstlich wie du an die Sache rangehst, ist es schon
vorprogrammiert, dass es schief geht.
