
Subject: Brustfett und Bauchfett
Posted by [helmutg](#) on Sat, 08 Sep 2012 08:49:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Freunde,

ich habe hier bereits gelesen aber konkrete Antwort zu meinem Problem konnte ich nicht finden. Bitte darum dringend um Antwort - es beschäftigt mich sehr.

Ich habe 3 Jahre lang Proscar 1 mg täglich genommen (ungefähr) und viel Fett an Bauch und Brust angesetzt obwohl ich sonst nicht dick war (geringes Mehrgewicht als "schlank". Dann hab ich Procar abgesetzt für 8 Monate und mich kräftig schlank gehungert (10 kg) und sehe jetzt sehr schlank aus - habe aber immer noch Bauchfett und Brustfett - wenn auch weniger - aber als sehr schlanker Mensch DEUTLICH zuviel an Brust und Bauch. Dann habe ich mein Gewicht gehalten und Proscar wieder eingenommen (wegen einsetzendem Haarausfall trotz Minoxidil). Bauchumfang und Brust nimmt nun sogar zu - alles sonst bleibt schlank.

Hat jemand das selbst an sich erlebt?

1. Hätte sich meine Brustfett wieder aufgelöst so als hätte ich das niemas eingenommen(???), wenn ich die Pause länger als 8 Monate gewesen wäre oder ist das Fett in Bach und Brust nicht wieder aufzulösen denn ich hatte - sehr schlank - immer noch, wenn auch weniger, Überfett an Bauch und Brust. Oder ist das nicht mehr zu korrigieren? Wer hat es selbst erlebt?

2. Soll ich mal nur jeden zweiten Tag 1mg nehmen? Im Forum wird ja auch von 0,5 mg geschrieben.

3. Proscar hilft vorsorglich gegen Prostatakrebs - habe im Umkreis Erkrankungs- und sogar Todesfälle und schon allein deshalb habe ich ein schlechtes Gefühl, ja regelrecht Angst, Proscar aufzugeben.

Zu guter Letzt: Im Netz liest man, das als nebenwirkung Fett um die Augen herum und um den Augapfel zerstört wird und das nicht wieder rückgangig wird. Jemand was in der Richtung erlebt - es macht ebenso ein ungutes Gefühl - oder eindeutig gesehen?

Kann ich dem Fettwachstum anders entgegenwirken? Sport und Abnehmen hilft jedenfalls nicht. Ein Medikament etc.?

Subject: Aw: Brustfett und Bauchfett
Posted by [Mr.Goodkat](#) on Sat, 08 Sep 2012 13:28:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

1. Das kann dir leider keiner so genau sagen, wie es bei idividuel ist. Eine Faustregel gibt es da nicht. Normalerweise sollte es wieder weggehen, vielleicht braucht es bei dir einfach mehr zeit. Ich würde einfach mal nach den Studien googlen.

2.Frage, der Indikation. Eigentlich reichen schon 0,25mg alle 2 Tage.

3.Du nimmst Proscar, wegen der Angst vor Prostata Krebs? Sonst für nichts?

Welcher Arzt verschreibt dir das? Ach, wenn du eine familiäre Vorgeschichte hast ist dies doch keine Indikation. Ich denke, du hast da mit dem Proscar auch etwas falsch verstanden. Es senkt das Risiko, jedoch sind die Formen des Krebs die dennoch auftreten können wesentlich aggressiver.

<http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=87057&Ausgabe=231252&ProduktNr=227337&filename=87057.pdf>

The new safety information is based on FDA's review of two large, randomized controlled trials: the Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) and the Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE) trial which evaluated daily use of finasteride 5 mg versus placebo for 7 years and daily use of dutasteride 0.5 mg versus placebo for 4 years, respectively, for the reduction in the risk of prostate cancer in men at least 50 years of age. The trials demonstrated an overall reduction in prostate cancer diagnoses with finasteride 5 mg and dutasteride treatment (see Data Summary below). This overall reduction was due to a decreased incidence of lower risk forms of prostate cancer. However, both trials showed an increased incidence of high-grade prostate cancer with finasteride and dutasteride treatment.

Google einfach mal nach Finasterid.

Subject: Aw: Brustfett und Bauchfett

Posted by [helmutg](#) on Sat, 08 Sep 2012 14:06:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nehme das schon wegen Haarausfall - fand aber die krebshemmende Wirkung dennoch wichtig. Die scheint sich auch zu bestätigen in diversen Artikeln.

Dennoch möchte ich nicht schlank sein mit Bierbauch und Cup A Brust.

Subject: Aw: Brustfett und Bauchfett

Posted by [mike.](#) on Sat, 08 Sep 2012 18:13:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Helmut,

einen Minidosis Aromatasehemmer kann helfen (mit ARZT und Blutkontrolle .. E2 könnte zu hoch sein .. was bei manchen von natur aus so ist je älter man wird...auch in jungen Jahren (war bei mir auch so zw. 20-24..das ich immer "weiblicher" wurde...die Ecken im gesicht rund wurden... .. VOR Finasterid und den ganzen Kram...)) ...

LG
Mike

Subject: Aw: Brustfett und Bauchfett
Posted by [pilos](#) on Sat, 08 Sep 2012 19:07:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

helmutg schrieb am Sat, 08 September 2012 11:49
3. Proscar hilft vorsorglich gegen Prostatakrebs - habe im Umkreis Erkrankungs- und sogar Todesfälle und schon allein deshalb habe ich ein schlechtes Gefühl, ja regelrecht Angst, Proscar aufzugeben.

das ist kein grund das zeug zu schlucken

Subject: Aw: Brustfett und Bauchfett
Posted by [mike.](#) on Sat, 08 Sep 2012 19:32:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...denn wenn es dann wirken soll (hoffen wir dass das nie eintritt) wirkt es wahrscheinlich nicht (upregulation usw...)
