

---

Subject: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 16 Jan 2013 13:38:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi,

hmm lese grade im Wiki-Artikel von Fin dieses

<http://de.wikipedia.org/wiki/Finasterid#Kontraindikationen>

Zitat:

...  
Finasterid nicht einnehmen dürfen Frauen und Personen unter 18 Jahren sowie Patienten mit häufiger Harnentleerung.

...

Ist mir ja ganz neu und lese ich zum 1. mal, das war vorher noch nicht drin!

Was hat es damit genau auf sich? Warum dürfen es solche nicht nehmen?  
Weiß das jemand genauer? Also richtig medizinisch erklärt?

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [pilos](#) on Wed, 16 Jan 2013 14:42:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

knopper22 schrieb am Wed, 16 January 2013 15:38hi,

hmm lese grade im Wiki-Artikel von Fin dieses

<http://de.wikipedia.org/wiki/Finasterid#Kontraindikationen>

Zitat:

...  
Finasterid nicht einnehmen dürfen Frauen und Personen unter 18 Jahren sowie Patienten mit häufiger Harnentleerung.

...

Ist mir ja ganz neu und lese ich zum 1. mal, das war vorher noch nicht drin!

Was hat es damit genau auf sich? Warum dürfen es solche nicht nehmen?  
Weiß das jemand genauer? Also richtig medizinisch erklärt?

weil es den muskulatur-tonus blase/prostata zusätzlich herabsetzt und man dann noch mehr "muss"

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 16 Jan 2013 15:21:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hmm hab ich ja noch nie gehört.  
Also so was wie der PC-Muskel, der auch für diese spasmodischen Kontraktionen verantwortlich ist, von naja ihr wisst schon...  
Könnte man da nicht mit Training entgegenwirken?

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [pilos](#) on Wed, 16 Jan 2013 15:53:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Wed, 16 January 2013 17:21hmm hab ich ja noch nie gehört.  
Also so was wie der PC-Muskel, der auch für diese spasmodischen Kontraktionen verantwortlich ist, von naja ihr wisst schon...

deshalb ist es ja auch nicht mehr so intensiv

Zitat:  
Könnte man da nicht mit Training entgegenwirken?

versuchen kann man vieles

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 16 Jan 2013 16:02:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Wed, 16 January 2013 16:53knopper22 schrieb am Wed, 16 January 2013

17:21hmm hab ich ja noch nie gehört.

Also so was wie der PC-Muskel, der auch für diese spasmodischen Kontraktionen verantwortlich ist, von naja ihr wisst schon...

deshalb ist es ja auch nicht mehr so intensiv

....

hmm du meinst jetzt das mit dem Spritzen usw..?

Liegt das nich eher am DHT selber? oder nur an dem Muskel?

Wie gesagt Training sollte helfen, so viel kann Fin gar nicht verändern....

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [Haareweg](#) on Wed, 16 Jan 2013 16:39:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Wed, 16 January 2013 17:02so viel kann Fin gar nicht verändern....

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [knopper22](#) on Wed, 16 Jan 2013 16:41:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haareweg schrieb am Wed, 16 January 2013 17:39knopper22 schrieb am Wed, 16 January 2013 17:02so viel kann Fin gar nicht verändern....

jedenfalls nicht bei jedem...

---

Subject: Aw: Patienten mit häufiger Harnentleerung????  
Posted by [pilos](#) on Wed, 16 Jan 2013 16:42:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Wed, 16 January 2013 18:02  
Liegt das nich eher am DHT selber? oder nur an dem Muskel?

.

beides