
Subject: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?
Posted by [ognn_](#) on Thu, 05 Jan 2017 22:37:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

habe mir letztens minox bestellt und zwar von kirkland.
Habe eine längere Zeit regaine Schaum verwendet, wollte aufgrund des Preises und der Variante fin topisch in minox aufgelöst nach pilos auf Fluid umsteigen.

Gestern Abend habe ich das aufgetragen, zunächst keine Probleme, allerdings ist meine Kopfhaut nun ziemlich gerötet an den aufgetragenen stellen und der Juckreiz hat begonnen.

Wollte nun fragen, ob man auch regaine Schaum verwenden könnte mit finasterid zsm, in dem man die Variante von Pilos verwendet foam 5% auf fluid 2,5% zu strecken und anschließend fin dazugibt.

Oder seht ihr eine andere Möglichkeit ?

VG

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?
Posted by [pilos](#) on Fri, 06 Jan 2017 10:47:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja...wenn man den wirkstoff vorher aus der tab extrahiert hat

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?
Posted by [ognn_](#) on Fri, 06 Jan 2017 11:15:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Den Wirkstoff aus der tab extrahieren ?

Du meinst, das man nach Herstellung von Fluid die fin Tablette in der Flüssigkeit auflösen lässt wie in deinem Beispiel.
Erwähnst ja in 20ml minox die 5mg Tablette einfach auflösen zu lassen.

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?
Posted by [ognn_](#) on Mon, 09 Jan 2017 18:02:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wollte meine Frage pushen, da ich keine Antwort erhalten habe

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?

Posted by [pilos](#) on Mon, 09 Jan 2017 21:21:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fin pulverisieren und im streckmittel für foam extrahieren

füllstoffe absetzen lassen und extrakt dem foam hinzufügen

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?

Posted by [ognn_](#) on Mon, 09 Jan 2017 21:56:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke !

Also

regaine Schaum in urinbecher füllen (3/4 des Volumens)

3ml Ethanol hinzufügen

5mg Fin mörsern und hinzugeben

Alles absetzen lassen, bis es flüssig wird.

Und danach weiter vorgehen wie du es in der Selbsthilfe beschreibst unter " regaine foam 5% zu Fluid 2,5% "

VG

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?

Posted by [pilos](#) on Tue, 10 Jan 2017 08:09:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ognn_ schrieb am Mon, 09 January 2017 23:56

Also

regaine Schaum in urinbecher füllen (3/4 des Volumens)

3ml Ethanol hinzufügen

5mg Fin mörsern und hinzugeben

Alles absetzen lassen, bis es flüssig wird.

Und danach weiter vorgehen wie du es in der Selbsthilfe beschreibst unter " regaine foam 5% zu Fluid 2,5% "

kannst auch mit wiegen arbeiten..ist einfacher...

am besten so eine waage bis 50-100g

5 mg Fin mörsern

in den urinbecher (graduierter PP Becher mit Schraubverschluss) geben

und in 9g/10 ml alk >70% geben...deckel zu

24-48h extrahieren immerwieder leicht schwenken

9g schaum dazugeben wenn es bereits flüssig ist, gewicht ablesen

mischen...fertig

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?

Posted by [ognn_](#) on Tue, 10 Jan 2017 14:02:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tut mir leid wenn ich erneut dazwischen funke.. habe zum einen nun fin 2,5mg in ethanol versetzt, damit der Wirkstoff extrahiert wird ...in einen separaten urinbecher habe ich nach deiner Anweisung in der Selbsthilfe [24] 3ml alkohol zu minox foam hinzugefügt.

Aber in der Selbsthilfe unter Punkt [24] erwähnst du

3ML 70% Alkohol

3/4 des Volumens eines urinbecher mit minox

Warten bis alles flüssig wird und weitere Schritte befolgen.

Und unter Punkt [44], nr.8

erwähnst du entweder 20-30-40ml Alkohol zu benutzen, anschließend 10-15-20 ml (je nach vorheriger Menge) wieder zu entnehmen.

Bei der 20ml Variante wären dies dann 10ml Alkohol zu 75% minoxvolumen im Urinbecher..

Welche Variante ist jetzt die richtige? Falls sich nun mein Schaum nicht auflöst einfach mehr Alkohol hinzugeben ?

Subject: Aw: Kirkland Fluid - doch lieber regaine foam ?

Posted by [pilos](#) on Tue, 10 Jan 2017 14:09:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ognn_ schrieb am Tue, 10 January 2017 16:02 Tut mir leid wenn ich erneut dazwischen funke.. habe zum einen nun fin 2,5mg in ethanol versetzt, damit der Wirkstoff extrahiert wird ...in einen separaten urinbecher habe ich nach deiner Anweisung in der Selbsthilfe [24] 3ml alkohol zu minox foam hinzugefügt.

Aber in der Selbsthilfe unter Punkt [24] erwähnst du
3ML 70% Alkohol
3/4 des Volumens eines urinbecher mit minox

Warten bis alles flüssig wird und weitere Schritte befolgen.

Und unter Punkt [44], nr.8
erwähnst du entweder 20-30-40ml Alkohol zu benutzen, anschließend 10-15-20 ml (je nach vorheriger Menge) wieder zu entnehmen.

Bei der 20ml Variante wären dies dann 10ml Alkohol zu 75% minoxvolumen im Urinbecher..

Welche Variante ist jetzt die richtige? Falls sich nun mein Schaum nicht auflöst einfach mehr Alkohol hinzugeben ?

lesen aber nicht verstehen ist ein großes problem hier im forum

das ist als messhilfe gedacht

8.) Beispiel Regaine: Von Foam 5% auf Fluid 2,5%

http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/274162/#msg_274162

ja softasept geht auch

gibst 20-30-40 ml softasept in ein leeres gut gespültes, belüftetes/trockenes senfglas (die 0,29 euro variante vom discounter)

mach 1 strich auf dem glas

nimm 10-15-20 ml wieder raus

gibst foam schaum voll rein....plastikdecke lose drauf, sonst springt er ab während das treibmittel ausgast.

wenn alles verflüssigt ist..siehst du wieviel es noch fehlt..dann gibst schaum nach..bis es in

flüssigem zustand die marke erreicht
dann hast du 2,5% minox

mach es mit der waage..dann passt es immer
