

---

Subject: Erstellung FIN topisch -> Propylenglycol?  
Posted by [citizenkane](#) on Sun, 19 Nov 2017 13:49:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo allerseits,

nach dem ich mich jetzt eingelesen habe, habe ich beschlossen neben der Verwendung von Minox mit der Verwendung von FIN topisch zu beginnen.

Mein Ziel ist es nach meiner HT (vor 13 Monaten) den Status Quo zu halten.

Folgende Schritte werden kommen:

- Bestellung Fincar (5mg) über indpharma.biz
- Bestellung 20 ml Pipettenflaschen über ebay
- Kauf günstigsten Vodka bei Aldi
- evlt. Kauf von Propylenglycol über dragonspice.de

Mein Mischverhältnis soll zum Beginn so gering wie möglich sein um zu beobachten, ob es zu Nebenwirkungen kommt.

Sollte nach 1-2 Monaten es zu keinen NW kommen, würde ich dann das Mischverhältnis erhöhen (0,3- 0,5- 0,75).

Mischverhältnis von 0,025% bzw 0,25 mg/ml sollte reichen.

D.h 5 mg --> 20 ml = 0,25 mg/ml.

Also eine 5 mg Tablette in der 20 ml Pipettenflasche aufgelöst mit 17 ml Vodka und 3 ml PG.

Meine Fragen:

- stimmt das Mischverhältnis so?
- macht es nicht Sinn größere Mengen in einer 60ml Flasche herzu stellen? Ich hatte da was davon gelesen, daß die Wirkung in den Flaschen nach läßt.
- Welchen Sinn hat Propylenglycol ?

---

---

Subject: Aw: Erstellung FIN topisch -> Propylenglycol?  
Posted by [Pandemonium](#) on Sun, 19 Nov 2017 17:07:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/22047/>

PG ist zur besseren Penetration.

---