
Subject: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun

Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 02 Apr 2018 12:16:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

seit 7 Wochen nehme ich nun Finasterid und bis vor 1 Woche auch noch die Minox-Lösung. Die ersten Wochen konnte ich beides problemlos anwenden. Seit einigen Wochen hatte ich aber vom Minox unerträgliches Kopfhaut-Jucken was mich nun eben vor einer Woche zum absetzen bewegt hat.

Neben dem Kopfhaut-Jucken hatte ich aber auch ein leichtes Jucken am ganzen Körper. Außerdem eine Quaddelbildung (ähnlich wie kleine Mückenstiche), welche ebenfalls am ganzen Körper aufgetreten sind. Diese waren jedoch nur vereinzelt und nicht großflächig. Trotzdem jucken sie stark. In letzter Zeit sind sie immer mehr im Bereich des Hosensbundes aufgetreten. Dort wo mechanische Reibung durch die Hose und Unterhose entsteht.

Ich dachte anfangs hierbei handelt es sich ebenfalls um eine allergische Reaktion auf die Minox-Lösung. Nur habe diese seit fast einer Woche abgesetzt. Das kopfhaut jucken ist auf einem normalen Niveau. Also nurnoch ab und zu leicht spürbar. Also viel besser als während der Minox-Anwendung.

Doch die winzigen Quaddeln tauchen immernoch auf.

Ich habe festgestellt, dass wenn ich Cetirizin (ein Anti-Allergikum) oral nehme (1 Tablette) habe ich für mindestens 2 Tage meine Ruhe. Keine Quattel-Bildung, kein jucken am Körper. Sogar die Haut ist nicht ganz so trocken. Und als ich noch Minox genommen habe wurde sogar das Kopf jucken geringer.

Naja dadurch, dass es eben nun nicht vom Minox kommen kann gehe ich davon aus, dass es wohl vom Finasterid kommen muss...

Wenn man bei google "nesselsucht" eingibt, kommen richtige horror-Bilder so extrem ist es bei mir ja nicht. Nur vereinzelt quaddeln. Wirklich gut mit mückenstichen zu vergleichen die ganz vereinzelt auftreten und innerhalb von 12h meist wieder verschwinden.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Legt sich dass wieder oder muss ich absetzen?

Schade wärs nur drumm, dass ich dann fast nichts mehr gegen meinen Haarausfall tun kann. Minox führt zu Kopfjucken. Finasterid zu quaddeln...

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun

Posted by [chess](#) on Mon, 02 Apr 2018 12:37:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hatte das selbe Problem wie du!
es kam durch das Finasterid.
Nesselsucht am ganzen Körper
sehr schwankend. es half dann
kurzfristig Urtimed 10mg Tabletten

langfristig auf ernährung achten:
wenig fett / zucker
v.a. fettige süßigkeiten wie
snickers/mars meiden und
auch einen großen Bogen um
Käse (v.a. kein Weichkäse!) sowie
fettiger Soucen machen...

Zudem evtl die Fin Dosis etwas
reduzieren. so hat es bei mir dann
sehr gut geklappt!

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun

Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 02 Apr 2018 12:53:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chess schrieb am Mon, 02 April 2018 14:37: ich hatte das selbe Problem wie du!
es kam durch das Finasterid.
Nesselsucht am ganzen Körper
sehr schwankend. es half dann
kurzfristig Urtimed 10mg Tabletten

langfristig auf ernährung achten:
wenig fett / zucker
v.a. fettige süßigkeiten wie
snickers/mars meiden und
auch einen großen Bogen um
Käse (v.a. kein Weichkäse!) sowie
fettiger Soucen machen...

Zudem evtl die Fin Dosis etwas
reduzieren. so hat es bei mir dann
sehr gut geklappt!

also kurzfristig kann ich mir mit den cetirizin 10mg tabletten eben auch ganz gut helfen. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Sogas würde ja nur in unnötigen Kettenreaktionen enden.

Ernährung ist bei mir eigentlich nicht all zu schlecht...

Ich werde aber mal drauf achten noch weniger Zucker zu essen. Süßigkeiten esse ich sowieso kaum bzw nur selten. Werde ich ab jetzt vollständig weg lassen.

Käse esse ich nur auf Pizza. Auf die kann ich aber nicht verzichten zumindest alle 14 Tage.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Mon, 02 Apr 2018 12:58:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir war es mal ein weisser
Käse (Schafskäse aus Bulgarien
Fatos oder so hieß der) sowie
extrem fettige Pizza...

offizieller Name für unser
Problem heißt übrigens
Urtikaria.

und ich glaube als nebenwirkung
steht es bei finasterid irgendwo
ganz unten mit dabei. allerdings
nicht, dass es erst in kombination
mit speziellen lebensmitteln wie bei
mir auftaucht. das war dann schon
eine überraschung. mein hautarzt
wollte mir erst nicht glauben....

wieviel fin nimmst du?

nimmst du die original 1mg
tabs oder teilst du 5mg version?

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 02 Apr 2018 13:29:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nehme derzeit noch die 1mg von ratiopharm. Werde aber beim nächsten Rezept versuchen die 5mg zu bekommen, weil die 1mg dinger schon recht teuer sind.

Aber ja nehme täglich 1mg.

Mich wundert es nur dass es bestimmt 4 Wochen problemlos geklappt hat und erst dann Hautprobleme aufgetreten sind.

Urtikaria ist ja nur der lateinische Name für Nesselsucht. Und ja steht auf dem Beipackzettel...

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Mon, 02 Apr 2018 13:34:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir waren es sogar
5-6 wochen bis es zu
den Ausschlägen kam.

ich vermute jedoch, dass
es weniger an der Zeit lag
sondern, dass erst an diesem
Tag die unglückliche Nahrungs-
Mittel-Kombination war.

die Bulgarische Mitbewohnerin
zog aus und ich hab mir den
Käse aus dem Kühlschrank
gekrallt, den ich sonst nie esse;)

ein anderes Mal war es wiegesagt
mit Pizza, da hatte ich allerdings
auch Dut neu im Regime.

letztlich wundert mich, dass
Nesselsucht zwar im Beipackzettel
steht, aber eben nicht, dass man
durch Fin neue Lebensmittel-
unverträglichen bekommen kann.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 02 Apr 2018 13:43:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich glaube nicht, dass es bei mir an lebensmittel liegt.

Nachdem es begonnen hat, ist es nämlich eig nie komplett abeklungen (außer an den Tagen

an denen ich das Cetrizin getestet habe). Manchmal war es stärker manchmal weniger stark. Aber meine gegessenen Lebensmittel sind immer anders. Und die von dir genannten esse ich eben eig nicht oft.

Von daher ist es bei mir eher ein Dauerzustand.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Mon, 02 Apr 2018 17:24:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bei mir war es wiegesagt eindeutig.
vor fin-einnahme hatte ich keine
nesselsucht bei besonders fettigen
lebensmitteln wie käse/pizza etc

daher fand ich es erstaunlich, dass
mir weder hautarzt glaueb n wollte
noch es nebenwirkung im beipack-
zettel stand (zumindest nicht in
bezug auf nahrungsmittelunvertr.)

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 02 Apr 2018 17:27:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok krass.

Ich hatte das vorher auch nie...

Ich hab eig noch die Hoffnungs dass es vielleicht eine vorübergehende Nebenwirkung ist und sich der Körper irgendwann dran gewöhnt oder vlt die 5mg variante (dann geteilt) das problem löst.

Ist nämlich auch kein Dauerzustand so.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Mon, 02 Apr 2018 17:29:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

du kannst ja auch schonmal
deine 1mg variante teilen.
0.5mg pro tag oder sogar
nur alle zwei tage sollten

auch ausreichen. und
ceterizin hilft etwas, aber
urtimeid hilft viel besser.
das würde ich auf jedenfall
mal anwenden, damit du
wieder komplett runterkühlst

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 02 Apr 2018 17:33:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chess schrieb am Mon, 02 April 2018 19:29du kannst ja auch schonmal
deine 1mg variante teilen.
0.5mg pro tag oder sogar
nur alle zwei tage sollten
auch ausreichen. und
ceterizin hilft etwas, aber
urtimeid hilft viel besser.
das würde ich auf jedenfall
mal anwenden, damit du
wieder komplett runterkühlst

möchte die Dosis anfangs nicht verringern. Wenn nämlich der status nicht besser wird oder
sich nicht hält. Kann man im nachhinein nicht sicher sagen ob es die geringe dosis war oder ob
fin generell nicht wirkt.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [Pandemonium](#) on Mon, 02 Apr 2018 17:33:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chess schrieb am Mon, 02 April 2018 19:29du kannst ja auch schonmal
deine 1mg variante teilen.
0.5mg pro tag oder sogar
nur alle zwei tage sollten
auch ausreichen. und
ceterizin hilft etwas, aber
urtimeid hilft viel besser.
das würde ich auf jedenfall
mal anwenden, damit du
wieder komplett runterkühlst
Bist du eigentlich Dichter geworden oder warum die vielen Absätze?

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun

Posted by [chess](#) on Mon, 02 Apr 2018 17:47:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ PaulBerg: verständlich, aber
höhere Dosis = höheres Risiko...
und: Urtimed >> Ceterizin

@Pandemonium: habe ich mir
von Juristen abgeschaut. kommt
einfach wertiger rüber so)

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Tue, 03 Apr 2018 15:40:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach exakt 7 Tagen kein Minoxidil mehr, kann ich aber davon ausgehen, dass Minox nicht Schuld an der Nesselsucht ist oder?

Ich will zwar einen Allergie-Test mit PG durchführen, dass Päckchen kommt aber erst in den nächsten Tagen und will jetzt die letzten 6 Wochen Minox nicht einfach wegwerfen indem ich zulange warte. Deshalb würde ich gerne dann heute wieder anfangen.

Oder kann es unter Umständen doch noch sein, dass auch das Minox die Nesselsucht auslöst auch noch nach 7 Tagen ? (Die halbwertszeit in der Haut ist ja ca. 22h)

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Tue, 03 Apr 2018 15:51:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

minoxidil topisch geht ja so gut
wie nicht ins blut. bei minox ist
wenn überhaupt eher der kopf/
augen/nase betroffen und nicht
der krörper.

das was du beschreibst spricht
100% für FIN. und steht ja auch
im Beipackzettel drin

wiegesagt: erstaunlich war ja
nur bei mir, dass es im kombi
mit spez. nahrungsmitteln kam.
sonst hätte ich mich gar nicht
gewundert...

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Tue, 03 Apr 2018 16:26:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kopf ist ja auch betroffen...

Unter minox hatte ich unerträgliches jucken und teilweise auch pfucken. Ich hab eben mittlerweile auch das gefühl, dass finasterid eben auch für dieses jucken verantwortlich ist und minox den effekt nur minimal verstärkt.

Zum ende hin war es echt nichtmehr ertragbar, aber ich wills jetzt nochmal probieren.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Tue, 03 Apr 2018 17:02:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wie besprochen ganz
eindeutig FIN. Mich
hatte mein Vater
gefragt, warum ich
so eine gesunde
Gesichtsfarbe hab

Minox ist in seinen
Nebenwirkungen
dagegen harmlos.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Tue, 03 Apr 2018 17:06:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich denks auch. Werd minox jedenfalls jetzt nochmal probieren.

Bei mir scheint es aber wirklich nicht lebensmittelabhängig zu sein... Das machts ziemlich kacke.

Hab hier mal gelesen, dass sich viele leichte Nebenwirkungen wieder legen. Darauf hoffe ich jetzt mal. Ich hoff das ist gewöhnungssache.
Ansonsten muss ich absetzen.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Tue, 03 Apr 2018 18:15:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, bei geringerer Dosis und längerer Laufzeit kann sich das auch einpegeln. Aber nur zu einem gewissen Grad. Wenn du sagst es ist absolut nicht auszuhalten, wird der Gewöhnungseffekt kaum ausreichend eintreten.

Lass dir utrimed verschreiben. Damit du zumindest für paar Tage wieder komplett runter kühlst. Ceterizin hilft, aber nicht so effektiv bei diesem Problem.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Tue, 03 Apr 2018 18:30:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chess schrieb am Tue, 03 April 2018 20:15Ja, bei geringerer Dosis und längerer Laufzeit kann sich das auch einpegeln. Aber nur zu einem gewissen Grad. Wenn du sagst es ist absolut nicht auszuhalten, wird der Gewöhnungseffekt kaum ausreichend eintreten.

Lass dir utrimed verschreiben. Damit du zumindest für paar Tage wieder komplett runter kühlst. Ceterizin hilft, aber nicht so effektiv bei diesem Problem.

Cetirizin hilft ganz gut. Hab vorhin mal wieder eine genommen. Nicht weil es nicht aushaltbar war sondern, weil mir die quaddeln heute im bart aufgetreten sind und das schaut nicht aus. Der ist zwar rasiert. aber an den stoppeln halt.

Cetirizin funktioniert bei mir sehr gut. Ich hab schon 1h nach der Einnahme absolut garkeine Symptome mehr. Und das erfahrungsgemäß für ca. 2 Tage. Von daher brauch ich mir da

jetz nichts anderes verschreiben zu lassen. Never change a winning team.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Tue, 03 Apr 2018 18:35:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde es dir trotzdem empfehlen.
Vllt hilft es ja auch einen Neustart
besser anzugehen. Urtimed hat
seinen Namen ja nicht von ungefähr

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Tue, 03 Apr 2018 18:47:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ah, ich hatte damals auch
heftige Bauchschmerzen.

Auch die gingen mit Urtimed
wieder weg und kamen
so auch nie wieder.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [Alecks](#) on Wed, 04 Apr 2018 03:58:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bist du unter 35 ?

<https://derma.plus/haut/roeschenflechte-pityriasis-rosea/>

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Wed, 04 Apr 2018 13:46:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alecks schrieb am Wed, 04 April 2018 05:58 bist du unter 35 ?

<https://derma.plus/haut/roeschenflechte-pityriasis-rosea/>

ja ich bin 20. Aber um ehrlich zu sein glaube ich nicht, dass ich das hab.

Erstens gab es keine einzelne Plaque die über längeren Zeitraum vorhanden war und zweitens habe meine Quaddeln (die nach wenigen Stunden bis maximal 1 Tag wieder verschwinden) keinen schuppenartigen Rand.

und drittens wird bei den Behandlungsmethoden eben kein Antiallergikum empfohlen, was aber bei meinen Symptomen sehr sehr gut hilft.

Ich habe übrigens sonst keine bekannten Allergien und habe daher eig auch vorher noch nie Cetirizin genommen.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Thu, 05 Apr 2018 16:12:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@chess:

Hast du eig mal versucht zwischendurch dein Finasterid komplett abzusetzen? Also zu schauen ob in deinem Fall die Lebensmittelunverträglichkeit reversibel ist?
Oder hat das Finasterid dass jetzt bei dir ausgelöst und absetzen bringt auch nichts mehr?

Da es bei mir ja wie gesagt willkürlich durchgehend aktiv ist ohne cetirizin, habe ich Angst davor dass es nicht reversibel ist, auch nach absetzen von finasterid...

An die andern ist eine durch Finasterid ausgelöste Nesselsucht reversibel?

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [chess](#) on Thu, 05 Apr 2018 18:00:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe es durchgezogen. Zumal ich mich auch schon vorher recht gesund ernähre.
Das mit dem Bulgarischen Teufels-Käse war ein einmaliger ausrutscher.

Ich nahm Urtimed hab etwa 1 Woche Pause gemacht (vllt auch 2) und binn dann direkt mit niedrigerer Dosis gefahren. Bis heute.

Anfangs war die Empfindlichkeit noch höher

bei Genuß von Chips, Eis, etc. aber auch das hat sich im Laufe der Monate (und inzw. Jahre) gelegt. Man sieht es jetzt wirklich kaum noch, selbst wenn ich mal was fettigeres esse (Nüsse etc).

Beweisen kann ich es natürlich nicht, es könnte theoretisch auch ein dummer Zufall gewesen sein. Aber ich bin sicher: diese dramatische Unverträglichkeit kam nur durch das Finasterid. Oder die Unverträglichkeit war schon immer auf sehr geringem Level da und erst durch Finasterid wurde das Level so erhöht, dass ich es gemerkt habe.

Definitiv war Finasterid der ausschlaggebende Faktor. Da stehe ich 100% zu.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Thu, 05 Apr 2018 18:14:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

glaub ich dir.

Und bei mir scheint es ja auch sehr sehr wahrscheinlich zu sein, dass es damit was zu tun hat. Ich geh aber davon aus dass es eine Unverträglichkeit auf die Tablette selbst ist.

Und ich zieh auch irgendwo den Schlussstrich. Mir sind meine Haare zwar viel Wert, aber gewiss nicht alles...

Ich lasse mir mein Leben dadurch nicht zu stark einschränken... (mal abgesehen von den ganzen fatalen Nebenwirkungen die auch nach Jahren erst beginnen können)

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Mon, 09 Apr 2018 15:11:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

gibts hier eig sonst keinen der diese Erfahrung gemacht hat?

Bin jetzt seit einigen Tagen voll auf Cetrizin, also täglich 1 Tablette. Damit kann ich quasi ein normales Leben führen trotz Finasterid. Aber ich merke dass ziemlich genau nach 24h die ersten Anzeichen der Allergie/Nesselsucht durchkommen. Also erste rote flecken oder leichter juckreiz. Nehme dann derzeit einfach schnell die nächste cetrizin und alles ist wieder gut.

Aber es scheint so als wird es immer schlimmer statt besser... vorher hatten die cetrizin tabletten

immerhin noch für 48h gehalten ohne das was durchkommt.

Werd mir jetzt mal bald einen Arzt-Termin geben lassen und nach Rat fragen. Bin mir leider nur sehr sicher, dass er mir das absetzen empfiehlt...

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Wed, 11 Apr 2018 15:35:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An die Experten:

Wenn ich einen Test durchführen wollte also absetzen möchte für eine kurze Zeit:

-Wie soll ich vorgehen? Sollte man Finasterid auch ausschleichen? Also erstmal Dosis reduzieren?

-Wie lange dauert es ca. bis die Nesselsucht sich abmindern bzw verschwinden müsste? Ich gehe davon aus dass es nicht direkt am nächsten Tag ist.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [xWannes](#) on Wed, 11 Apr 2018 20:52:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

a) Ausschleichen ist nicht nötig.

b) Die Halbwertszeit von Finasterid wird allgemein mit 6 bis 8 Stunden angegeben, sodass es nach ca. 2 bis 4 Tagen abgebaut ist. Eine echte Anreicherung erfolgt nicht. Die DHT-Senkung hält jedoch länger an, da Finasterid mit der 5-alpha-Reduktase einen Komplex bildet, dessen Halbwertszeit bei 30 Stunden liegt.

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [Alecks](#) on Thu, 12 Apr 2018 03:06:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

in deinem Fall gebe ich meinem Vorposter recht

Subject: Aw: Möglicherweise leichte Nesselsucht von Finasterid... Was tun
Posted by [PaulBerg](#) on Thu, 12 Apr 2018 19:49:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es könnte also innerhalb einer halben Woche weg sein, wenn es am Finasterid selbst liegt.

Oder bei einer Halbwertszeit von 30h mal mindestens 7 Tage dauern.
