

---

Subject: Topisch Finasterid und Gyno vermeiden  
Posted by [Intoleranz1](#) on Thu, 23 Mar 2023 09:11:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Altes Thema für mich. Die Angst vor Nebenwirkungen.

Meine rechte Brustwarze fängt nach Tagen niedrig dosierten fin an zu Jucken.  
Psyche kann ich da nicht ausschließen muss ich zugeben.

Gibt es einen Weg wie ich sicher überprüfen kann das sich keine Gyno entwickelt? Wäre Horror Szenario für mich.

---

---

Subject: Aw: Topisch Finasterid und Gyno vermeiden  
Posted by [berger](#) on Thu, 23 Mar 2023 20:23:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jeder Mann hat eine Brustdrüse, genau wie eine Frau theoretisch, natürlich sind diese idR deutlich weniger entwickelt als bei Frauen.  
Gynäkomastien bei Männern entstehen idR durch Hormondysbalancen, beispielsweise beim Klinefelter Syndrom(genetisch) oder beispielsweise auch bei Adipositas (Übergewicht).  
Nachweisen würde man sowas beim Arzt durch Tastuntersuchung + Blutabnehmen (bestimmen von LH, FSH, Prolaktin, Testosteron, Östradiol,  $\beta$ -HCG).  
Aber mal abgesehen davon entsteht sowas auch nicht über Nacht und auch normalerweise nicht asymmetrisch (nur auf einer Seite)

Quelle: bin selber Doc in ca. 4 Monaten, alles ohne Gewähr, am Ende wenn du total unsicher bist nen Arzt aufsuchen

---