
Subject: Dutasterid und Kindeswunsch

Posted by [demo99](#) on Wed, 04 Oct 2006 10:25:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dutasterid besitzt ein grosses Verteilungsvolumen (300-500 l) und ist in hohem Masse an Plasmaproteine gebunden (>99,5%; an Albumin und alpha-1 saures Glykoprotein). Die Steady State-Serumkonzentration (C_{ss}) von ungefähr 40 ng/ml bei einer Dosierung von 0.5 mg Dutasterid täglich wird nach 6 Monaten erreicht. Nach 1 Monat erreichen die Dutasterid-Serumspiegel 65%, nach 3 Monaten ungefähr 90% der Steady State-Konzentration. In der Samenflüssigkeit wird die Steady State-Konzentration ebenfalls nach 6 Monaten erreicht. Nach 12-monatiger Einnahme lag die Dutasterid-Konzentration in der Samenflüssigkeit im Durchschnitt bei 3,4 ng/ml (Bereich 0,4 – 14 ng/ml), d.h. im Durchschnitt 11,5% des Serumspiegels.

Quelle:

http://www.dr-ouwerkerk.com/fachinfo/avodart_dt.htm

Somit kann Dutasterid in die Samenflüssigkeit gelangen. Auf was ich eigentlich hinaus will:

Dutasterid hemmt DHT und kann somit die Entwicklung von männlichen Föten stören.

Dutasterid kann auch über die Haut aufgenommen werden. somit auch über schleimhäute

folglich nimmt die Frau Dutasterid bei einem Samenerguss auf.

Aber ist diese Menge dann gefährlich für die Schwangerschaft bzw. sollte man unmittelbar den Sex nach der Schwangerschaft einstellen um die Dutasterid-Aufnahme zu unterbrechen?

Ich glaube nicht, denn dieser Spezialartikel für das Finasterid ist wissenschaftlich belegt und dutasterid hemmt auch dht, was die Gefahr birgt.

<http://www.endokrinologie.net/profil/gremien/kommissionen/homontoxikologie/stellungnahme4.html>

aber das muss jeder für sich entscheiden

danke im voraus

mfg demo99

Subject: Re: Dutasterid und Kindeswunsch

Posted by [Karsten_G](#) on Wed, 04 Oct 2006 16:34:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Erste messbare Veränderungen des DHT-Spiegels treten aber erst bei einer

Finasterid-Menge von 5000 Nanogramm auf. Dies bedeutet, dass es selbst bei optimaler Resorption erst ab 3 Liter Ejakulat-Kontakt täglich theoretisch zu ersten messbaren Veränderungen des weiblichen DHT-Spiegels kommen kann.

<http://www.haarerkrankungen.de/aktuelles/haarsinglenewsmeldung.php4?newsid=20020618>

Subject: Re: Dutasterid und Kindeswunsch
Posted by [lhs76](#) on Thu, 05 Oct 2006 18:53:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und?

thema verfehlt:-)

Subject: Re: Dutasterid und Kindeswunsch
Posted by [Karsten_G](#) on Thu, 05 Oct 2006 19:01:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Re: Dutasterid und Kindeswunsch
Posted by [pilos](#) on Thu, 05 Oct 2006 19:11:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

demo99 schrieb am Mit, 04 Oktober 2006 12:25

folglich nimmt die Frau Dutasterid bei einem Samenerguss auf.

schon mal was von kondome gehört....
