

---

Subject: "halbe" thomapyrin aufheben?

Posted by [lala](#) on Wed, 30 May 2007 13:05:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

leute, wie ist das: ich brauche, wenn ich kpfschmerzen habe, fast nie eine ganze thomapyrin, sonder teile sie und nehme eine hälfte ein. die andere hälfte steck ich immer zurück in das tablettendings, trau mich aber nicht, die zu nehmen, wenn ich wieder eine tablette bräuchte. oft liegt die da ja dann schon 3 monate. ich werf die andere hälfte dann weg, aber so werfe ich letztendlich die halbe packung weg.

langer rede kurzer sinn: kann/sollte man die halbierten tabletten aufheben und noch einnehmen?

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?

Posted by [Ka\\$h](#) on Wed, 30 May 2007 13:21:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also wenn die nicht allzu alt ist würde ich die noch nehmen, mach ich auch immer so!

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?

Posted by [stussy](#) on Wed, 30 May 2007 13:37:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

denke auch das macht nichts ...

In der 3. Welt werden abgelaufene Medikamente verteilt ;-/

Teilen und eine spätere einnahme ist sicher problemlos

Thomapyrin wirkt bei mir auch gut wobei es ja "nur" :

Zusammensetzung

Wirkstoffe: 250 mg Acetylsalicylsäure, 200 mg Paracetamol, 50 mg Coffein

Hilfsstoffe: Maisstärke, Lactose, Stearinsäure

ist

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?

Posted by [lala](#) on Wed, 30 May 2007 17:52:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stussy schrieb am Mit, 30 Mai 2007 15:37denke auch das macht nichts ...

In der 3. Welt werden abgelaufene Medikamente verteilt ;-/

wenn ich eine geschlossene packung hätte, die seit ein paar wochen abgelaufen ist, würd ich die tabletten auch noch nehmen, sie sind ja noch luftdicht verpackt..

ich frage, weil ich mal eine aspirin halbiert hatte und die hälfte, die ich aufgehoben hatte, war nach 3 wochen gelblich/braun.

ist offenbar doch nicht so ohne, wenn luft dran kommt. war aber an einem dunklen/kühlen ort gelagert

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [stussy](#) on Wed, 30 May 2007 18:04:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

na in einer Packung sind doch genug drin : 10 Stück  
Wenn du eh nur alle 3 Monate ca. ne halbe nimmst...  
dann frage jemandem auf der Arbeit oder nen Freund ob er Kopfweg hat und gibst ihm die Hälfte

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [xxlborn](#) on Wed, 30 May 2007 18:58:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kannst sie ja hier zur professionellen entsorgung zur verfügung stellen. bei proscar klappts ja auch hervorragend ansonsten würd ich mir da garkeine gedanken machen, kann mir nicht vorstellen das da irgendwas passiert.

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [MarcVen](#) on Fri, 01 Jun 2007 11:07:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

lala schrieb am Mit, 30 Mai 2007 15:05leute, wie ist das: ich brauche, wenn ich kpfschmerzen habe, fast nie eine ganze thomapyrin, sonder teile sie und nehme eine hälfte ein. die andere hälfte steck ich immer zurück in das tablettendings, traue mich aber nicht, die zu nehmen, wenn ich wieder eine tablette bräuchte. oft liegt die da ja dann schon 3 monate. ich werf die andere

hälfte dann weg, aber so werfe ich letztendlich die halbe packung weg.

langer rede kurzer sinn: kann/sollte man die halbierten tabletten aufheben und noch einnehmen?

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [stussy](#) on Fri, 01 Jun 2007 13:46:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

genau oder dann selber zusammenstellen was in Toma... drin ist

Vielleicht gibt es alle "zutaten" in "Deiner" nötigen Dodierung...

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [lala](#) on Fri, 01 Jun 2007 14:21:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MarcWen schrieb am Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 01 Jun 2007 14:48:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:21MarcWen schrieb am Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

aspirin?

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [lala](#) on Fri, 01 Jun 2007 21:09:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:48lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:21MarcWen schrieb am Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

aspirin?

ich bitte dich. ist doch ein völlig anderes medikament

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [stussy](#) on Fri, 01 Jun 2007 21:26:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 23:09glockenspiel schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:48lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:21MarcWen schrieb am Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

aspirin?

ich bitte dich. ist doch ein völlig anderes medikament

fast

Zusammensetzung

Wirkstoffe: 250 mg Acetylsalicylsäure (ASS : ASPIRIN) , 200 mg Paracetamol, 50 mg Coffein  
Hilfsstoffe: Maisstärke, Lactose, Stearinsäure

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [lala](#) on Fri, 01 Jun 2007 21:36:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stussy schrieb am Fre, 01 Juni 2007 23:26lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 23:09glockenspiel  
schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:48lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:21MarcWen schrieb am  
Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann  
könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

aspirin?

ich bitte dich. ist doch ein völlig anderes medikament

fast

Zusammensetzung

Wirkstoffe: 250 mg Acetylsalicylsäure (ASS : ASPIRIN) , 200 mg Paracetamol, 50 mg Coffein

Hilfsstoffe: Maisstärke, Lactose, Stearinsäure

eben.

aspirin: ein wirkstoff (ASS)

thomapyrin: drei wirkstoffe (ASS, paracetamol, coffein).

aspirin bringt bei mir rein gar nichts

is jetzt eh wurscht. ich nehm die angebrochenen halben einfach ab jetzt. nur die harten kommen  
in` garten

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [stussy](#) on Fri, 01 Jun 2007 21:40:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

oder wer es öfters nimmt : die 3 wirkstoffe einzeln kaufen... Ist vielleicht günstiger

Jedoch wenn lala des soo selten nimmt : lohnt es nicht wirklich

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [otto\\_m](#) on Fri, 01 Jun 2007 21:52:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

vielleicht die drei Wirkstoffe in ihre Grundstoffe zerlegen, wird noch billiger

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [Unkreativer](#) on Mon, 04 Jun 2007 12:27:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:  
aspirin bringt bei mir rein gar nichts

Warum denn dann was mit Aspirin nehmen

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 04 Jun 2007 13:13:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 23:09glockenspiel schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:48lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:21MarcWen schrieb am Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

aspirin?

ich bitte dich. ist doch ein völlig anderes medikament

gehts noch? aspirin ist einfach ein schwächeres schmerzmittel.

so what?

edit: ha, danke stussy. lala hat ja sehr viel ahnung von inhaltsstoffen, wie es scheint.

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [glockenspiel](#) on Mon, 04 Jun 2007 13:15:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Unkreativer schrieb am Mon, 04 Juni 2007 14:27Zitat:  
aspirin bringt bei mir rein gar nichts

Warum denn dann was mit Aspirin nehmen

lol. ich bitte dich Unkreativer, ist doch ganz was anderes.

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [Mona](#) on Tue, 05 Jun 2007 14:26:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Mit, 30 Mai 2007 15:05leute, wie ist das: ich brauche, wenn ich kpfschmerzen habe, fast nie eine ganze thomapyrin, sonder teile sie und nehme eine hälfte ein. die andere hälfte steck ich immer zurück in das tablettendings, trau mich aber nicht, die zu nehmen, wenn ich wieder eine tablette bräuchte. oft liegt die da ja dann schon 3 monate. ich werf die andere hälfte dann weg, aber so werfe ich letztendlich die halbe packung weg.

langer rede kurzer sinn: kann/sollte man die halbierten tabletten aufheben und noch einnehmen?

Hi, Lala

Muss es denn zwingend Thomapyrin sein ?  
Paracetamol in Verbindung mit Acetylsalicylsäure und Coffein ?

Paracetamol z.B. kannst du als Saft / Lösung bekommen und selber dosieren.  
Von AL / STADApHarm / Ratiopharm beispielsweise je um die 3 Euro.  
( N1 -> 100 ml -> 200 mg )  
Normaldosierung: 500 mg

Liebe Grüße, Mona

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [lala](#) on Mon, 11 Jun 2007 13:47:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Mon, 04 Juni 2007 15:13lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 23:09glockenspiel schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:48lala schrieb am Fre, 01 Juni 2007 16:21MarcWen schrieb am Fre, 01 Juni 2007 13:07Gibt es die Tabletten nicht in ner schwächeren Dosierung? Dann könnte man sich doch das Teilen sparen und brav eine Ganze nehmen.

nicht dass ich wüsste

aspirin?

ich bitte dich. ist doch ein völlig anderes medikament

gehts noch? aspirin ist einfach ein schwächeres schmerzmittel.

so what?

edit: ha, danke stussy. lala hat ja sehr viel ahnung von inhaltsstoffen, wie es scheint.

huch, da komm ich aus dem urlaub und sehe ihr seid zwischenzeitlich hier ja gut abgegangen

ich wollte eigtl nur wissen, ob halbierte tabletten nach einigen monaten noch ohne gesundheitliche risiken eingenommen werden können. sonst nichts. danke für die ratschläge.

Zitat:gehts noch? aspirin ist einfach ein schwächeres schmerzmittel.

lies halt einfach mal, hm? ich nehme eine halbe thomapyrin, d.h. darin ist nicht wesentlich mehr ASS enthalten als in einer ganzen aspirin. die einnahme einer aspirin lindert meine kopfschmerzen aber leider zu etwa 0%, weshalb thomapyrin, mit seinen (neben ASS) zwei weiteren wirkstoffen, wohl doch eine andere ((bei mir) bessere) wirkung haben muss.

so what?

@ mona

ja, danke, könnte es auch mal mit paracetamol alleine versuchen, als saft, wobei ich schon denke, dass diese kombination (ASS, paracetamol, koffein) sehr gut wirkt

---

---



Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [glockenspiel](#) on Tue, 12 Jun 2007 17:29:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ist gut, "lala", ist gut.

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [erroramp](#) on Tue, 12 Jun 2007 17:43:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Mon, 11 Juni 2007 15:47  
@ mona

ja, danke, könnte es auch mal mit paracetamol alleine versuchen, als saft, wobei ich schon denke, dass diese kombination (ASS, paracetamol, koffein) sehr gut wirkt

Na dann schmeisst Du zu den 200mg Paracetamol eben noch zwei oder drei 100mg ASS hinterher.  
Nachspülen kannst dann ja mit Red Bull.

Gruß  
Chris

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [lala](#) on Tue, 12 Jun 2007 18:05:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

erroramp schrieb am Die, 12 Juni 2007 19:43lala schrieb am Mon, 11 Juni 2007 15:47  
@ mona

ja, danke, könnte es auch mal mit paracetamol alleine versuchen, als saft, wobei ich schon denke, dass diese kombination (ASS, paracetamol, koffein) sehr gut wirkt

Na dann schmeisst Du zu den 200mg Paracetamol eben noch zwei oder drei 100mg ASS hinterher.  
Nachspülen kannst dann ja mit Red Bull.

Gruß  
Chris

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [otto\\_m](#) on Tue, 12 Jun 2007 18:19:13 GMT

---

paracetamolsaft? igitt...

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [erroramp](#) on Tue, 12 Jun 2007 18:45:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, da haste Recht...eigentlich ist der Saft für Kinder gedacht und schmeckt nach Erdbeeren, oder so.

Nicht zu verwechseln mit Dingen für Erwachsene, die ebenfalls nach Erdbeeren schmecken. Selbst wenn der Großteil der männlichen Erdbevölkerung davon überzeugt ist, dass auch das gegen Kopfschmerzen wirkt...

@lala:

Du kannst Paracetamol auch in den Dosierungen 125mg und 250mg als Tabletten bekommen. Schmecken nicht so beschissen wie der Saft...und sie bleiben länger verwendbar.

Wenn selbst so eine Minidosis (1/2 Thomapyrin) bei Deinen Kopfschmerzen ausreicht, brauchst Du vielleicht gar kein ASS mehr zusätzlich.  
Einfach mal testen.

Gruß  
Chris

PS:Wenn ich Kopfschmerzen habe, brauche ich immer zwei Thomapyrin, oder gleich was Härteres...

---

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [lala](#) on Tue, 12 Jun 2007 19:35:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

erroramp schrieb am Die, 12 Juni 2007 20:45Ja, da haste Recht...eigentlich ist der Saft für Kinder gedacht und schmeckt nach Erdbeeren, oder so.  
Nicht zu verwechseln mit Dingen für Erwachsene, die ebenfalls nach Erdbeeren schmecken. Selbst wenn der Großteil der männlichen Erdbevölkerung davon überzeugt ist, dass auch das gegen Kopfschmerzen wirkt...

das verstehe ich nicht.. was meinst du denn damit? erklär mal

@lala:

Du kannst Paracetamol auch in den Dosierungen 125mg und 250mg als Tabletten bekommen. Schmecken nicht so beschissen wie der Saft...und sie bleiben länger verwendbar.

ja, ich vesuch das mal mit paracetamol alleine. ich dachte eben, mir würde die kombi im thomapyrin helfen, aber das kann ja auch täuschen.

Wenn selbst so eine Minidosis (1/2 Thomapyrin) bei Deinen Kopfschmerzen ausreicht, brauchst Du vielleicht gar kein ASS mehr zusätzlich.  
Einfach mal testen.

Gruß  
Chris

PS:Wenn ich Kopfschmerzen habe, brauche ich immer zwei Thomapyrin, oder gleich was Härteres...

das würd mich umhaun. naja, kommt wohl auch aufs körporgewicht an, oder? am besten ist...: schlaafen. ach ja..

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [erroramp](#) on Tue, 12 Jun 2007 20:00:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

lala schrieb am Die, 12 Juni 2007 21:35Ja, da haste Recht...eigentlich ist der Saft für Kinder gedacht und schmeckt nach Erdbeeren, oder so.  
Nicht zu verwechseln mit Dingen für Erwachsene, die ebenfalls nach Erdbeeren schmecken.  
Selbst wenn der Großteil der männlichen Erdbevölkerung davon überzeugt ist, dass auch das gegen Kopfschmerzen wirkt..[/b]

das verstehe ich nicht.. was meinst du denn damit? erklär mal

Na klar, kann ich bei Gelegenheit mal machen.

@lala:

Du kannst Paracetamol auch in den Dosierungen 125mg und 250mg als Tabletten bekommen.  
Schmecken nicht so beschissen wie der Saft...und sie bleiben länger verwendbar.

ja, ich vesuch das mal mit paracetamol alleine. ich dachte eben, mir würde die kombi im thomapyrin helfen, aber das kann ja auch täuschen.

Wenn selbst so eine Minidosis (1/2 Thomapyrin) bei Deinen Kopfschmerzen ausreicht, brauchst Du vielleicht gar kein ASS mehr zusätzlich.  
Einfach mal testen.

Gruß  
Chris

PS:Wenn ich Kopfschmerzen habe, brauche ich immer zwei Thomapyrin, oder gleich was Härteres...

das würd mich umhaun. naja, kommt wohl auch aufs körperrgewicht an, oder? am besten ist...: schlaafen. ach ja..

Nee, das bestimmt nicht...

Ich bin lediglich 170cm "groß" und 60 kg "schwer".

Das hängt wohl eher mit dem individuellen Stoffwechsel zusammen...

Gruß  
Chris

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [Mona](#) on Wed, 13 Jun 2007 02:04:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

erroramp schrieb am Die, 12 Juni 2007 20:45

Du kannst Paracetamol auch in den Dosierungen 125mg und 250mg als Tabletten bekommen. Schmecken nicht so beschissen wie der Saft...und sie bleiben länger verwendbar. Als Suppositorium für Kleinkinder / Kinder.

Zitat:Ja, da haste Recht...eigentlich ist der Saft für Kinder gedacht und schmeckt nach Erdbeeren, oder so.

Nicht nur - er wird auch ausgegeben an Patienten, die Probleme haben, Tabletten einnehmen zu können.

Liebe Grüße, Mona

---

Subject: Re: "halbe" thomapyrin aufheben?  
Posted by [erroramp](#) on Wed, 13 Jun 2007 07:48:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ooops, Du hast ja Recht, Mona.

Ich habe bei Medizinfuchs nur gelesen: "PARACETAMOL STADA 250, 10 ST, Hersteller: k.A." und dachte mir: Hey, super!"

Die Dinger würden wohl auch nicht so toll schmecken...

Gruß  
Chris